

resoch panónskej oblasti hojne až veľmi hojne, v karpatskej oblasti najmä v nižších polohách okresov obvodov predkarpatskej flóry a vnútrokarpatských kotlín hojne, v ostatných častiach územia len lokálne, vo vyšších polohách chýba.

Ú ž i t k o v o s ť. Liečivá rastlina (*Herba alliariae*). Droga má dezinfekčné účinky (využitie pri liečbe hnisavých rán, zápalov pokožky, na kloktanie a i). Hlavnými obsahovými látkami sú glykozidy (allylsulfid, sinigrín, alliarín), beta karotén, kyselina askorbová a ďalšie (účinky drogy nie sú ešte dostatočne preskúmané).

LITERATÚRA

J a l a s, J., S u o m i n e n, J. (eds.): Atlas Florae Europaeae 10, *Cruciferae (Sisymbrium to Aubrieta)*, p. 33. Helsinki University Printing House, Helsinki, 1994.

M a r k g r a f, F. et al.: *Alliaria Scop.* In: Hegi, G., *Illustrierte Flora von Mitteleuropa* 4/1, ed. 2, p. 118-120. Verlag Paul Parey, Berlin, Hamburg, 1975.

4. Myagrurn L.

Myšojed

(SPRACOVALI E. KRÁLIK, O. ŤAVODA)

Myagrurn L. Sp. Pl. ed. 1, p. 640, 1753.

Z á k l a d n é c h r o m o z ó m o v é č í s l o: $x = 7$

1. *Myagrurn perfoliatum* L.

Myšojed prerastenolistý

Ic.: Tab. 18, fig. 4, p. 167

Myagrurn perfoliatum L. Sp. Pl. ed. 1, p. 640, 1753.

Jednoročná alebo ozimná, 20-50(-80) cm vysoká bylina, pri rozotretí zapáchajúca. Byľ priama, rozkonárená, listnatá, holá, modrasto oinovatená, s riedkymi prízemnými listovými ružicami; ružice v čase kvitnutia zaschnuté. Všetky listy celistvé; listy v ružici obrátene kopijovité, na báze klinovito zúžené, zúbkaté, niekedy až plytko lýrovite laločnaté, s výraznou belavou hlavnou žilou. Byľové listy sediace, dolné podlhovasto lopatkovité, šipovitou bázou objímavé, na vrchole tupo končisté, celistvookrajové až plytko zúbkaté. Súkvetie strapcovité (terminálny a 2-3 pazušné strapce); strapce spočiatku hustokveté, neskoršie (počas kvitnutia) predĺžené a riedkokveté. Kvety stopkaté, šikmo odstávajúce. Stopky kvetov kratšie ako kalich. Kališné lístky vzpriamené, drobné (2-2,5 mm dlhé), opadavé. Ko-