

chalko et E. Michalková 1992 SAV; Törökóvá 1993 HUM). – Jasenov, hradný vrch (Hudáková 1975 SLO; Törökóvá 1979 HUM). – Jasenov, vrch Hórka (Hudáková 1975 SLO; Törökóvá 1987 HUM). – vrch Sokol (Hudáková 1975 SLO; Törökóvá 1994 HUM). – vrch Sokol – Tretia skala (Hudáková 1975 SLO; Törökóvá 1984 HUM). – vrch Podskalka (Hudáková 1975 SLO). – Ptičie, vrch Humenská (Hudáková 1975 SLO; Törökóvá 1977 HUM; J. Michalko et E. Michalková 1992 SAV). – Kamenica nad Cirochou, vrch Drieňová (Törökóvá 1987 HUM). **26b.** Vítkovce (J. Michalko 1964 SAV). **30a.** Sedlice, Pustý mlyn (Futák 1973 SAV). **30c./20.** – Brekov, Brekovský hradný vrch (Gallo 1973 BRA; Hudáková 1975 SLO; Törökóvá HUM).

Pravdepodobné alebo neoverené údaje: **3.** Plešivecká planina, Gemerské lúky. – Veľké bahniko (obe Hábervová Ochr. Prír. – Výskum. Pr. 6b: 33, 1988). **15.** Opátka (J. Michalko 1965).

**O c h r a n a.** Ohrozený druh (EN), panónsky, matrasko-predkarpatský alebo predkarpatský endemit.

### 7. *Erysimum repandum* L.

#### Horčičník rozložitý

Ic.: Tab. 23, fig. 1, p. 211

*Erysimum repandum* L. Demonstr. Pl. Horti Upsal., p. 17, 1753.

Syn.: *Erysimum ramosissimum* Crantz 1762.

Dvojročná bylina. Koreň nitovitý až drevnatejúci, sivohnedý až hnedastý. Byľ vzpriamená alebo vystúpavá, zväčša bohato rozkonárená, tuhá, ryhovaná, 7,5–40,5 cm vysoká, sivozelená, na báze chlpatá a smerom k vrcholu roztrúsená až riedko chlpatá (chlpy len vidlicovité). Listy ružice ca 1,7×0,15 cm veľké (pri kvitnúcich rastlinách sú zachované len na mladých jedincoch); listy v dolnej polovici byle stopkaté; stopky 1–3 cm dlhé, žltozelené až fialkasté; čepeľ podlhovastá až obrátene úzko vajcovitá, na okraji nerovnako oddialene naspäť zúbkatá alebo takmer celistvookrajová, v smere pozdĺžnej osi sprehybaná, na vrchole kapucňovitá, žltozelená, 1,5–6×0,15–1,3 cm veľká, na líci slabo drsno riedko chlpatá (chlpy vidlicovité a 3-ramenné, na hlavnej žile chlpy len vidlicovité), na líci aj na rube slabo drsno roztrúsená chlpatá; listy v hornej polovici byle sediace, podlhovasté, na okraji plytko oddialene zúbkaté, sprehybané, na vrchole končisté 1–3×0,1–0,6 cm veľké, sivozelené alebo žltozelené, na líci aj na rube roztrúsená chlpatá (chlpy vidlicovité a 3-ramenné). Listene úzko elipsovité, takmer celistvookrajové, 1,3–2×0,15–0,2 cm veľké, odenie ako pri horných byľových listoch. Vreteno súkvetia v dolnej časti roztrúsená chlpatá a smerom k vrcholu chlpatá. Stopky kvetov 4-hranné, 1–3,5 mm dlhé, sivozelené, roztrúsená chlpatá až chlpatá (chlpy len vidlicovité). Kališné lístky 5–6×0,8–1 mm veľké, bledozelené, na vonkajšej strane chlpaté (chlpy vidlicovité, 3-, 4-ramenné), na vnútornej holé. Korunné lupienky 7–10 mm dlhé; lupene 2–3×1–2 mm veľké, bledosírovožlté, na vonkajšej strane roztrúsená chlpatá (chlpy dlhé 3-ramenné), na vnútornej holé. Tyčinky 6–7 mm dlhé. Šešule pevné, oblúkovito nahor vyhnuté, husto nerovno-