

1998 SAV; S o m o g y i 2000 SAV). – Bratislava, časť Rusovce, okraj poľa asi 200 m pred odbočkou do Čunova (F e r á k o v á 1999 SLO; E. M i c h a l k o v á et Z a c h a r 1999 SAV). – Komárno, časť Nová Stráž, pri rieke Dunaj (D o r o t o v i č o v á 1995 PMK). – Veľké Kosihy (K l o k n e r 1975 PMK). – Sereď – Nitra, odbočka na Báb [E l i á š Biológia (Bratislava) 10: 834, 1978; E l i á š sen. s. d. herb. E l i á š sen.]. – Komárno (J e h l í k l. c.). 8. Čierna nad Tisou, železničná stanica (H e j n ý 1957 PR; J e h l í k l. c.).

LITERATÚRA

J e h l í k, V. (ed.): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. Academia, Praha, 1998.

M á j o v s k ý, J., F e r á k o v á, V.: *Chorispora tenella* (P a l l.) D C., nový druh slovenskej flóry. Biológia (Bratislava) 28: 73–76, 1973.

14. *Euclidium* W. T. A i t o n

Blahobyľ

(SPRACOVALA E. MICHALKOVÁ)

Euclidium W. T. A i t o n, Hort. Kew. 4, ed. 2, p. 74, 1812.

Z á k l a d n é c h r o m o z ó m o v é č í s l o : $x = 7$

1. *Euclidium syriacum* (L.) W. T. A i t o n

Blahobyľ sýrska

Ic.: Tab. 52, fig. 2, p. 495

Euclidium syriacum (L.) W. T. A i t o n Hort. Kew. 4, ed. 2, p. 74, 1812.

Baz.: *Anastatica syriaca* L. Sp. Pl., ed. 2, p. 895, 1763.

Syn.: *Myagrum syriacum* (L.) L a m. 1783 – *Soria syriaca* (L.) D e s v. 1815.

Jednoročná bylina. Koreň v priemere asi 1 mm hrubý, sivohnedý. Byľ oblá, ryhovaná, 9–35 cm vysoká, svetlohnedá, riedko až roztrúsene chlpatá (stopkaté vidlicovité chlpy sú jediným typom odenia na celej nadzemnej časti rastliny). Dolné listy v riedkej ružici, stopkaté (v čase zrelosti plodu zaschnuté); stopka listu na báze rozšírená, úzko krídlatá, 1,5–2,5 cm dlhá, zelenkastohnedá, riedko chlpatá; čepeľ elipsovité, na báze pretiahnutá, na okraji nepravidelne zúbkatá, 3,9–7,6 × 0,9–1,6 cm veľká, zelenkastohnedá, v mezofyle myrozínové bunky (povrch sa javí ako bodkovaný), na líci aj na rube takmer holá; listy v dolnej polovici byle stopkaté; stopka 0,4–2 cm dlhá, riedko chlpatá; čepeľ široko podlhovastá, elipsovité až úzko vajcovité, 2–6,5 × 0,3–1,5 cm veľká, hnedastozelená, plytko nepravidelne zúbkatá, na líci aj na rube riedko až roztrúsene chlpatá; listy v hornej polo-