

- Tausch, I. F.: Über die in Böhmen vorkommenden, zu *Brachylobos* gehörigen Arten von *Nasturtium*. Flora 23: 706-718, 1840.
- Tomšovic, P.: K výskytu dvoch druhov *Rorippa* na Slovensku. Biológia (Bratislava) 20: 622-626, 1965a.
- Tomšovic, P. Taxonomický rozbor československých druhů rodu *Rorippa* Scop. em. Reichenb. Dizertač. Práce, depon. Katedra botaniky Přír. Fak. UK, Praha, 1965b.
- Tomšovic, P.: Nejdůležitější výsledky revize československých rukví (*Rorippa* Scop. em. Reichenb.). Preslia 41: 21-48, 1969.
- Tomšovic, P.: *Rorippa* Scop. - rukev. In: Hejný, S., Slavík, B. (eds.), Květena České republiky 3, p. 76-86. Academia, Praha, 1992.

17. *Nasturtium* W. T. Aiton

Potočnica

(SPRACOVALA K. GOLIAŠOVÁ)

Nasturtium W. T. Aiton Hort. Kew., ed. 2, 4, p. 109, 1812, nom. cons.

Syn.: *Nasturtium* sect. *Cardaminum* (Moench) DC. 1821 - *Rorippa* sect. *Cardaminum* (Moench) Beck 1892.

Asi 5-6 druhov, rozšírených takmer po celom svete, predovšetkým na severnej pologuli.

Základné chromozómové číslo: $x = 8$

1. *Nasturtium officinale* W. T. Aiton

Potočnica lekárska

Ic.: Tab. 29, fig. 2, p. 263

Nasturtium officinale W. T. Aiton Hort. Kew. 4, ed. 2, p. 110, 1812.

Syn.: *Sisymbrium nasturtium-aquaticum* L. 1753 - *Cardaminum nasturtium* Moench 1794 - *Nasturtium fontanum* (Lam.) Aschers. 1860, nom. illeg. - *Rorippa nasturtium* (Moench) Beck 1892, nom. illeg. - *R. nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek 1905.

Trváca, holá alebo riedko chlpatá bylina; chlpy jednoduché. Byľ plná alebo dutá, poliehavá, na uzloch zakoreňujúca, v hornej časti vystúpavá, rozkonárená, (10-)30-80(-150) cm dlhá. Listy mierne dužinaté, nepárno perovito zložené, v obryse elipsovité až obrátene vajcovité, 5-10×2-5 cm veľké; lístky spravidla protistojné, sediace, celistvookrajové alebo nepravidelne plytko vrúbkované, bočné lístky najčastejšie elipsovité až takmer okrúhlasté, niekedy kopijovité až deltovité v (1-)2-3(-4) jarmách, vrcholový lístok spravidla väčší ako bočné, najviac 4 cm dlhý, široko okrúhlastý, elipsovitý až obličkovitý, zriedkavo veľkosťou a tvarom rovnaký ako bočné; myrozínové bunky bez chlorofylu, pri lykovej časti cievnych zväzkov. Kvety stopkaté, v hustých, spočiatku chocholikatých strap-