

činec (Mráz et Somogyi 1998 SAV). - Prakovce, pod Bielym kameňom (Mráz 1996 SAV). - Kojšovská hoľa, chata Erika (Zsák 1941 BRA, BP). 16. Muránska Huta, dolina potoka Župkov (Kochjarová et Hrouda 1987 SLO, SAV). 21a. Martinské hole (Futák 1942 SLO). 21b. úpätie Malého Kriváňa (Margittai 1908 BP, BRA). - úpätie Veľkého Kriváňa (Maloch 1921 PRC). - Dolina Bystrička (Margittai 1913 BP). 21c. Biela voda (Margittai 1914 BP). - Vyšná Revúca (Polážkovič s. a. BRA). - Lubochnianska dolina, nad horárňou Raková (Marhold 1985 SAV). 21d. Sivý vrch N (Schaffer 1928 SLO). 22., 23a., 23b., 23c. Mnoho lokalít vo vyšších polohách. 28. Pilsko, Bystrý potok (Grulich 1989 MMI). - Babia hora, mnoho údajov.

Nepravdepodobný údaj: 24. Poľana Huta (Gustawicz 1880 KRAM) - *Cardamine amara* subsp. *opicii* na tejto lokalite v súčasnosti nerastie, vyskytuje sa tu len *C. amara* subsp. *amara*, ide pravdepodobne o zámenu schedy.

9. *Cardamine parviflora* L.

Žerušnica malokvetá

Ic.: Tab. 39, fig. 1, p. 369

Cardamine parviflora L. Syst. Nat. 2, ed.10, p. 1131, 1759.

Jednoročná, 10-30(-40) cm vysoká bylina. Koreň tenký. Byľ priama, sprehybaná, jednoduchá alebo väčšinou len v hornej polovici rozkonárená. Listy v čase kvitnutia bez prízemnej ružice. Byľové listy v počte 6-30, perovito strihané, holé, s 3-11 jarmami segmentov; segmenty obrátene kopijovité až čiarkovité, celistvo-okrajové, na konci krátko hrotité. Strapec alebo strapcová metlna 5-150-kvetá. Kališné lístky s blanitým lemom, 1-1,3 mm dlhé. Korunné lupienky vzpriamené, obrátene kopijovité, 2-2,5(-3) mm dlhé, na vrchole zaokrúhlené, biele. Tyčíniek 6; peľnice žlté. Čnelka s nerozšírenou polguľovitou bliznou. Stopky plodov šikmo odstávajúce. Šešule vzpriamené, 10-18×0,7-0,8 mm veľké.

Chromozóm y: $2n = 16$, okr. 8, Leles W, pri mŕtvom ramene rieky Tisa. - Vojany W, pri odbočke z cesty Vojany - Veľké Raškovce do Drahňova [obe Marhold Phytom (Horn) 34: 31, 1994].

Biológia, ekológia, fytoecológia. Terofyt. Kvitnutie máj-jún. Rastie na otvorených stanovištiach rôzneho charakteru. Môžu to byť zamokrené okraje polí, zamokrené zníženiny v poli, brehy a obnažené dna rybníkov v planárnom stupni.

Celkové rozšírenie. Vyskytuje sa takmer v celej Európe, pričom chýba na niektorých ostrovoch a na väčšine Balkánskeho polostrova, zasahuje do severnej Afriky a do Ázie. Populácie v Severnej Amerike bývajú niekedy hodnotené ako samostatný taxón.

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 60. V minulosti bol výskyt tohto druhu hojnejšie dokumentovaný z Východoslovenskej nížiny. Ojedinelý údaj, v súčasnosti nepotvrdený, je známy z Podunajskej nížiny. V posledných rokoch sa objavili aj lokality na Záhorskej nížine, kde sa v pohraničnej oblasti s Českou republikou a Rakúskom mierne šíri.