

- sú poliehavé) 2
- 2a Byliny holé. Prízemné a dolné byľové listy obrátene vajcovité ± celistvo-
okrajové, alebo po oboch stranách s 1-3 plytkými zubmi; všetky listy hrubé (± kožovité). Šešule v súplodí ± jednostranne odstávajúce, 1,3-1,5(-1,8) mm široké 2. *C. neglecta*
- 2b Byliny ± chlpaté. Prízemné a dolné byľové listy podlhovasté, obrátene kopijovité, lýrovito perovito dielne až strihané; všetky listy tenké (nie sú kožovité). Šešule v súplodí všestranne odstávajúce, 1,1-1,2 mm široké
..... *C. arenosa* agg. .. 3
- 3a Byľ štíhla, 5-20 cm vysoká, ± len málo rozkonárená, ± riedko chlpatá. Korunné lupienky (4-)5-6 mm dlhé, biele alebo ružové 3. *C. borbasii*
- 3b Byľ hrubšia, 20-30 cm vysoká, bohato rozkonárená, ± husto chlpatá. Korunné lupienky až 10 mm dlhé, zväčša žiarivo biele 4. *C. petrogena*

1. *Cardaminopsis halleri* (L.) H a y e k

Žerušník Hallerov

Cardaminopsis halleri (L.) H a y e k Fl. Steierm. 1, p. 479, 1908.

Baz.: *Arabis halleri* L. Sp. Pl. ed. 2, p. 929, 1763.

Syn: *Arabidopsis halleri* (L.) O ' K a n e e t A l - S h e h b a z 1997.

Trváca bylina s tenkým rozkonáreným podzemkom, s početnými nadzemnými zakoreňujúcimi výhonkami, zakončenými listovou ružicou. Byľ priama až vystúpavá, jednoduchá, (5-)10-25(-50) cm vysoká, prevažne holá alebo roztrúsene chlpatá; chlpy jednoduché aj vidlicovité (zriedkavo viacramenné). Plodná byľ poliehavá. Prízemné a dolné byľové listy dlho stopkaté, celistvé (čepeľ vajcovito okrúhlastá až okrúhlastá alebo okrúhlasto srdcovitá), celistvookrajové alebo na báze len s 1 párom plytkých tupých zubov alebo delené (lýrovito perovito strihané, segment na vrchole vajcovito okrúhlastý); byľové listy okrúhlasté až vajcovité alebo elipsovité až úzko elipsovité, celistvookrajové alebo po oboch stranách s 2 alebo viacerými tupými plytkými zubmi. Stopky kvetov priamo odstávajúce, 4-8(-10) mm dlhé. Korunné lupienky široko obrátene vajcovité, s krátkym nechítkom, na vrchole okrúhlasté, na okraji zvlnené, 4-6 mm dlhé, biele alebo fialkasté. Šešule rovné, 10-22×0,8-1 mm veľké; čnelka na plode 0,5-1 mm dlhá; stopky plodov šikmo odstávajúce, 5-10 mm dlhé. Semená asi 1 mm dlhé, na vrchole s úzkym krídlatým lemom.

Kľúč na určenie poddruhov

- 1a Byľ zväčša sprehybaná, až 50(-55) cm vysoká. Prízemné listy okrúhlasto srdcovité alebo lýrovito perovito strihané, na vrchole s vajcovito okrúhlastým segmentom. Kvety väčšie; korunné lupienky 4-6 mm dlhé
..... I. subsp. *halleri*
- 1b Byľ rovná, najviac do 30 cm vysoká. Prízemné listy okrúhlasté až vajcovi-