

nelesklé. Strapce málo (5–25)-kveté. Stopky kvetov priamo až šikmo odstávajúce, 3–6(–10) mm dlhé. Kališné lístky vzpriamené, 3–4,5 mm dlhé, sýtozelené, smerom k báze žltkasté, ± nie sú vakovito vyduté. Korunné lupienky 5–9,5×1–2,5 mm veľké, na vrchole utaté až mierne vykrojené, biele. Stopky plodov šikmo až rovnovážne odstávajúce, 8–17 mm dlhé. Šešule ± rovné, priamo až šikmo odstávajúce, 40–85×1,6–2 mm veľké, holé; chlopne šešúľ s výraznou strednou žilou; čnelka plodu ca 0,5 mm dlhá. Semená v obryse podlhovasto vajcovité až vajcovité, silne sploštené, 1,7–2,2×0,8–1 mm veľké, nekrídlaté, v puzdre 1-radové; osemenie oranžovohnedé až tmavohnedé.

Chromozóm y: $2n = 14$ (extra fines).

Biológia, ekológia, fytoecológia. Rastie na vysychavých, humózných, často skeletnatých, na živiny bohatých pôdach, predovšetkým na bážických horninách (vápenci, čadiči a pod.), vzácne aj na kyslejších horninách kolínneho a submontánneho stupňa. Maximum: ca 900 m n. m., okr. 13, vrch Vysoká (Futák 1947a: 169). Vyskytuje sa v spoločenstvách radu *Quercetalia pubescentis*, vzácne v rade *Fagetalia*.

Celkové rozšírenie. Areál nesúvislý, s ťažiskom rozšírenia v južnej časti strednej Európy; na západ až do Pyrenejí, na východe vo Východných Alpách a v Západných Karpatoch, na juhu najďalej v strednom Taliansku. Údaje z juhovýchodnej Európy sú pravdepodobne mylné.

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 73. Výskyt bol zaznamenaný vo fyto geografických okresoch Malé Karpaty, Tribeč a Strážovské a Súľovské vrchy.

Carpaticum. 13. Košecké Podhradie (Futák et Jasičová 1963 SAV). – Podhradská dolina (Futák et Jasičová 1963 SAV). – Omšenie, vrch Žihľavník (F. Weber 1925 BRA). – Timoradza, skupina Kňazí stól: vrch Vysoká (Futák 1944 SLO; Futák 1947a: 169). – vrch E od vrchu Vysoká (Futák l. c.).

Všeobecné údaje: 10. Malé Karpaty (F. A. Novák in Veselý (ed.) Ochr. Českoslov. Přír. a Kraj. 2, p. 348, 1954). 12. Tribeč (Futák 1947a: 49).

Ochrana. Vzácne sa vyskytujúci druh zaradený v zozname ohrozených druhov pre nedostatočné (chýbajúce) údaje do kategórie **DD**.

3. *Arabis turrata* L.

Arábka ovisnutá

Ic.: Tab. 45, fig. 2, p. 433

Arabis turrata L. Sp. Pl. ed. 1, p. 665, 1753.

Krátkodobo trvajúca bylina, s prízemnou ružicou listov a zvyčajne s jednou byľou. Byľ ± priama, (25–)40–95 cm vysoká, v hornej polovici niekedy rozkonárená, husto listnatá, oblá, po celej dĺžke s pritisnutými i odstávajúcimi rozkonárenými chlpmi, svetlozelená, často fialkastá. Listy prízemnej ružice v čase kvitnutia ± zaschnuté, vajcovito kopijovité a elipsovité, nepravidelne plytko zúbkaté, na