

Celkové rozšírenie. Endemit Európy. Južné Karpaty a hory Balkánskeho polostrova.

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 73. Výskyt je doložený údajmi z oblasti Slovenského krasu a Malých Karpát. V prípade herbárových dokladov z Podunajskej nížiny (Bratislava, Trnávka) môže ísť aj o pestované alebo splanené exempláre. Novšie výskyt druhu nebol zistený.

Pannonicum. 3. Dvorníky, Dolný vrch (D o m i n et K r a j i n a 1937 KO - zmiešaná položka s *A. turrita*). 6. Bratislava, Trnávka (J o n á š o v á 1964 BRA; L u k e š o v á 1964 BRA - pravdepodobne pestovaný alebo splanený).

Carpaticum. 10. Bratislava, Železná Studienka (D o m i n 1923p: 208; s. coll. 1935 BRA; F. A. N o v á k in V e s e l ý (ed.) Ochr. Českolov. Prír. a Kraj. 2: 350, 1954). - vrch Vysoká (D o m i n 1923p: 208; S u z a 1948a: 3). - Čierna skala. - Biele hory (obe F. A. N o v á k in V e s e l ý l. c.).

5. *Arabis soyeri* R e u t. et A. H u e t

Arábka dúškolistá

Arabis soyeri R e u t. et A. H u e t Ann. Sci. Nat., Sér. 3, 19: 251, 1853.

U nás len

subsp. *subcoriacea* (G r e n.) B r e i s t r.

Arábka dúškolistá lesklá

Ic.: Tab. 46, fig. 1, p. 441

Arabis soyeri subsp. *subcoriacea* (G r e n.) B r e i s t r. Bull. Soc. Sci. Dauph. 61: 615, 1947.

Baz.: *Arabis subcoriacea* G r e n. in F. W. S c h u l t z Arch. Fl. France Allem., p. 274, 1853.

Syn.: *Arabis jacquinii* B e c k 1884 - *A. bellidifolia* J a c q. 1764.

Trvácá bylina s tenkými plazivými rozkonárenými podzemkami, s jednou alebo viacerými byľami a zvyčajne s niekoľkými bočnými listovými (často predĺženými) ružicami, na báze bylí a listových ružíc výrazné svetlé, pomerne dlhé niťovité zvyšky stopiek a stredných žíl odumretých listov. Byle na báze vystúpavé alebo priame, tuhé, (10-)15-35(-45) cm vysoké, holé. Všetky listy sýtozelené, mierne mäsité, holé, neinovatené, lesklé, vzácne po stranách stopiek riedko chlpaté; chlpy jednoduché; listy prízemných ružíc zaschnuté až po odkvitnutí, najčastejšie 3-6×0,7-1,5 cm veľké; čepeľ lopatkovitá, elipsovité až obrátene vajcovité, na báze postupne zúžená do 1-3 cm dlhej stopky, celistvookrajová alebo oddialene tupo zúbkatá, po oboch stranách s 1-3 zubmi, na vrchole zaokrúhlená až tupo končístá. Byľové listy málopočetné (najčastejšie 5-10-početné), od bázy byle postupne sa zmenšujúce, elipsovité, podlhovasté, vajcovité až kopijovité, tupo končísté, zväčša celistvookrajové, srdcovitou až uškato srdcovitou bázou sediace.