

- Tatranská Javorina, Zadné Meďodoly (S c h i d l a y 1946 BRA). - vrch Predné Jatky (F u t á k 1946 SLO). - Dolina Siedmich prameňov (H a d a č et Š m a r d a Rastl. Kotl. Siedmich Pram. p. 38, 1960). - Dolina Siedmich prameňov, chata Plesnivec (F á b r y 1870 BRA; V. N á b ě l e k 1936 BRA, SAV; F u t á k 1961 SAV; S c h e r f e l s. d. BRA). - Kopské sedlo - chata Plesnivec (M á j o v s k ý 1963 SLO). - Tatranská Kotlina, vrch Pálenica (F u t á k 1967 SAV). - Tatranská Kotlina, vrch Husár (F u t á k 1966).

6. *Arabis alpina* L.

Arábka alpínska

Ic.: Tab. 46, fig. 3, p. 441

Arabis alpina L. Sp. Pl. ed. 1, p. 664, 1753.

Syn.: *Arabis crispata* W i l l d. 1809 - *A. pieninica* W o ě l. 1909.

Trvácá bylina, zvyčajne s jednou kvitnúcou byľou a niekoľkými vystúpavými sterilnými výbežkami ukončenými riedkou listovou ružicou; výbežky tvoria vanúšovitú trsy. Byľ priama alebo vystúpavá, 8-35 cm vysoká, zväčša jednoduchá, chlpatá. Listy sterilných výbežkov elipsovité, obrátene vajcovité až lopatkovité, ± hrubo zúbkaté, postupne zúžené do 0,5-1,5 cm dlhý, často krídlatej stopky; byľové listy v počte 3-7, vajcovité až okrúhlasté, 12-2,5 cm dlhé, ostro riedko zúbkaté, na báze srdcovité až šípovité, objímavé; všetky listy zelené, ± husto pokryté rozkonárenými chlpmi. Kališné lístky (3-)3,5-4 mm dlhé, svetlozelené, vonkajšie na báze výrazne vakovito vyduté. Korunné lupienky 7-11×2,5-4(-5) mm veľké, s nenáhle zúženým nechtíkom, biele. Šesule priamo až rovnovážne odstavajúce, 30-50 mm dlhé, holé; chlopne šesúľ ploché, s ± nezreteľnou strednou žilou; karpofor 0,4-1 mm dlhý; semená v obryse široko elipsovité až okrúhle, silno stlačené, 1,2-1,5 mm dlhé, po celom obvode s krídlatým, svetložltým až svetlohnedým lemom; osemenie červenohnedé.

C h r o m o z ó m y: $2n = 16$, okr. 21c, Ľubochňa, Ľubochnianska dolina (H i n d á k o v á in M á j o v s k ý et al. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 26: 16, 1978); okr. 21c, Zadné Meďodoly (K o c h j a r o v á Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 39: 68, 1992); okr. 24, Červený Kláštor, Storočný prameň (U h r í k o v á, M á j o v s k ý et K r á l i k in M á j o v s k ý et al. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Suppl. 1, 29, 2000 - ut *A. pieninica*).

V a r i a b i l i t a. Príbuzenský okruh druhov *A. alpina* a *A. caucasica* zahrnuje v južných oblastiach svojho areálu zatiaľ nie veľmi prehľadnú skupinu geograficky a ± morfológicky vyhranených skupín populácií. Karpatské horské populácie sú pomerne homogénne, zrejme totožné s alpskými a svojimi znakmi (mohutnejšie, často viac rozkonárené rastliny s byľami ± rovnomerne listnatými) len nenápadne odlišné od severských. Rastliny opísané z poľskej časti Pienin na základe pomerne väčších korunných lupienkov a hustejšieho odenia ako samostatný druh *A. pieninica* W o ě l. sú skôr extrémnymi morfotypmi v rámci celkovej variability karpatských populácií. Navyše, populácie v slovenskej časti Pienin sa svojimi