

- Borbás, V.: Az egygyaras holdviola földbeli titka. Kert 1: 129-134, 1895.
- Dvořák, F.: Poznámka k *Lunaria annua* subsp. *pachyrrhiza* (Borb.) Hayek. Biológia (Bratislava) 23: 549-553, 1968.
- Dvořák, F.: Některé výsledky studia rodu *Lunaria* L. Biológia, Bratislava 25: 723-730, 1970.
- Ferlay, V., Mallet, G., Masson, A., Ucciani, E., Gruber, M.: Composition en acides gras des huiles de graines d'espèces spontanées du sud-est méditerranéen. Oléagineux 48: 91-97, 1993.
- Jalas, J., Suominen, J., Lampinen, R. (eds.): Atlas Florae Europaeae 11. *Cruciferae* (*Ricotia* to *Raphanus*). Helsinki University Printing House, Helsinki, 1996.
- Sedláčková, M.: *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. Preslia 64: 241-256, 1992.
- Ťavoda, O., Mráz, P.: *Lunaria rediviva* L. (mesačnica trváca) na Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 20: 82-97, 1998.

## 25. Aurinia Desv.

### Taričník

(SPRACOVALA K. GOLIAŠOVÁ)

*Aurinia Desv.* J. Bot. Agric. 3: 162, 1815 („1814“)

Syn.: *Alyssum* sect. *Aurinia* (Desv.) W. D. J. Koch 1836 - *Alyssum* L. 1753, p. p.

Poloker, husto hviezdovito chlpatý s mohutnými viachlavými koreňmi, početnými prízemnými listovými ružicami a stonkami; hviezdovité chlpy krátkostopkaté, ± odstávajúce. Stonky priame alebo vystúpavé, jednoduché alebo v hornej časti rozkonárené. Listy prízemnej ružice ± vzpriamené, dlhostopkaté, obrátene vajcovité až obrátene kopijovité, oddialene hrubo zúbkaté až ± celistvookrajové, až 10(-15) cm dlhé. Stopky listov žliabkaté. Stonkové listy sediace, kopijovité až čiarkovito kopijovité, celistvookrajové, oveľa menšie ako prízemné. Kvety žlté, v chocholíkatých strapcoch usporiadaných v metline; dolné konáre súkvetia niekedy oddialené. Nitky všetkých tyčíniek nekrídlaté, len s bazálnymi zúbkami. Nektária po jednom na oboch stranách vonkajších tyčíniek. Plodom je rovnobežne s priehradkou sploštená (šírokopriehradková), 2-puzdrová, v obryse okrúhlastá, elipsovité až široko obrátene vajcovité, 4-semenná šešulka (v každom puzdre po 2 semenách); chlopne sploštené (celé ploské). Semená sploštené, ± krídlaté. Klíček bokovo koreňový.

Poznámka. Podstatné znaky v tvare šešuliek, listov, veľkosti listov a odeň pri tomto taxóne (listy obrátene vajcovité až obrátene kopijovité, oddialene hrubo zúbkaté, až 15 cm veľké, hviezdovité chlpy krátkostopkaté, šešulky celé ploské) na rozdiel od taxónov rodu *Alyssum* [listy čiarkovité, čiarkovito kopijovité, kopijovité až podlhovasté, celistvookrajové len do 2(-2,5) cm dlhé, hviezdovité chlpy sediace, šešulky v strede (± nepravidelne) vypuklé], podnietili viacerých autorov vyčleniť ho z rodu *Alyssum* do samostatného rodu. Toto vyčlenenie rešpektujeme aj v našej flóre.