

1. *Lobularia maritima* (L.) Desv.

## Lobulária prímorská

Ic.: Tab. 52, fig. 3, p. 495

*Lobularia maritima* (L.) Desv. J. Bot. Agric. 3: 162, 1815 („1814“), nom. cons.Baz.: *Clypeola maritima* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 652, 1753.Syn.: *Alyssum maritimum* (L.) Lam. 1783 - *Koniga maritima* (L.) R. Br. 1826 - *Alyssum odoratum* Hort. - *Alyssum benthamii* Hort.

Jednoročná (v prirodzenom areáli trváca), sivo páperistá alebo ± husto chlpatá (chlpy vidlicovité), zriedkavo holá bylina. Byl husto listnatá, poliehavá alebo vystúpavá až priama, od bázy rozkonárená, (5-)10-40 cm vysoká. Listy sediace, celistvookrajové; dolné obrátene vajcovité; horné čiarkovito kopijovité, 2-4 cm dlhé. Kvety drobné, v strapcoch; strapce na vrchole chocholíkaté, po odkvitnutí značne predĺžené. Stopky kvetov chlpaté. Kališné lístky odstávajúce, vajcovité, asi 1,5 mm dlhé. Korunné lupienky na vrchole zaokrúhlené, s krátkym nechťikom, (2,5-)3-3,5×2-3 mm veľké, biele, červenkasté alebo fialové. Tyčinky bez krídiel a zubov. Semenník s 1-5(-10) vajíčkami. Čnelka krátka (0,3-0,5 mm), trváca; blizna jednoduchá. Plodom je v obryse obrátene vajcovitá až okrúhlastá, mierne (rovnobežne s priehradkou) sploštená, 2-3(-3,5) mm dlhá, husto až riedko chlpatá, 2-semenná šešuľka (v každom puzdre 1 semeno); stredná žila chlopni málo zreteľná, diafragma lesklá; čnelka na plode krátka. Semená elipsoidné, úzko krídlaté, 1,2-1,5 mm dlhé; osemenie po navlhčení slizovatie.

Chromozómy:  $2n = 24$ , okr. 6, Bratislava (Uhríkovi in Májovský et al. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 25: 9, 1976);  $2n = 36, 42, 48$  (extra fines).

Biológia, pôvod. V našich podmienkach terofyt, v pôvodnom areáli (resp. v teplejších oblastiach chamefyt). Kvitnutie júl-september(-október). Entomogamná aj autogamná, medonosná rastlina. Pôvodný areál tohto západomediterránneho druhu je v pobrežných oblastiach okolo Stredozemného mora, na Azorských a Kanárskych ostrovoch a na Madeire. Pestuje sa v mnohých štátoch Európy a Ázie, ale aj v Severnej a Južnej Amerike a na Novom Zélande.

Rozšírenie na Slovensku. Dokladované údaje o splnení sú zatiaľ z Podunajskej nížiny (okolie Bratislavy) a Východoslovenskej nížiny (Kráľovský Chlmec).

Pannonicum. 6. Bratislava (Féráková 1976 SLO). - Bratislava, Prešovská ulica (Féráková in Májovský et al. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 25: 9, 1976). - Bratislava, časť Devín, v obci (Féráková 1999). 8. Kráľovský Chlmec, pri ceste neďaleko mesta (Chrtková et Chrtková 1977 PR).

Úžitkovosť. U nás sa pestuje ako okrasná letnička s dekoratívnymi kvetmi, ktorá príležitostne splnieva. Najčastejšie sa pestujú kultivary 'Snow Carpet' s bielymi kvetmi, 'Lilakönigin' s fialovými kvetmi, 'Benthamii' s nízkym vanúšovitým vzrastom a 'Variegatum' so žltobielo škvrnitými listami. Semená štip-