

ľavej chuti, v minulosti sa využívali v ľudovom lekárstve (pod označením Semen Thlaspeos maritimi).

LITERATÚRA

- D u d l e y, T. R., C u l l e n, J.: Studies of old world *Alyssae* H a y e k. Feddes Repert. 71: 218-228, 1965.
 M a r k g r a f, F. et al.: *Lobularia* D e s v. In: Hegi, G., Illustrierte Flora von Mitteleuropa 4/1, ed. 2, p. 290, 291. Verlag Paul Parey, Berlin, Hamburg, 1975.
 S m e j k a l, M.: Noví zástupci československé adventivní květeny. Čas. Slez. Mus., Ser. A, 5: 35-39, 1956.

28. Berteroa D C.

Šedivka

(SPRACOVALA E. MICHALKOVÁ)

Berteroa D C. Mém. Mus. Hist. Nat. 7: 232, 1821.

Z á k l a d n é c h r o m o z ó m o v é č í s l o: $x = 8$

1. *Berteroa incana* (L.) D C.

Šedivka sivá

Ic.: Tab. 52, fig. 1, p. 495

Berteroa incana (L.) D C. Reg. Veg. Syst. Nat. 2, p. 291, 1821.

Baz.: *Alyssum incanum* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 650, 1753.

Syn.: *Camelina incana* (L.) J. Presl et C. Presl 1819 - *Farsetia incana* (L.) W. T. Aiton 1812 - *Moenchia incana* (L.) Roth 1788.

Jednoročná, dvojročná až krátkodobo trvávajúca bylina. Koreň drevnatejúci, sivohnedý alebo belavý; koreňová hlava v priemere až 1,5 cm. Byľ väčšinou od bázy bohato rozkonárená alebo jednoduchá, vzpriamená alebo vystúpavá, oblá, na báze drevnatejúca, listnatá, (15-)25-60(-80) cm vysoká, sivozelená, v dolnej časti často fialkastá, celá roztrúsene chlpatá až chlpatá (chlpy hviezdovité). Listy striedavé, sivozelené až žltkasto zelené, na stopke a strednej žile často fialkasté, na líci aj na rube riedko až husto chlpaté (chlpy hviezdovité); dolné listy na báze byľ ± nakopené, stopkaté; stopka 1,6-2,5 cm dlhá; čepeľ podlhovastá až obrátene úzko vajcovitá, na báze pretiahnutá, takmer celistvookrajová, 1,7-4,5×0,5-1 cm veľká; ostatné byľové listy krátku stopkaté (stopka úzko krídlatá, 0,2-0,5 cm dlhá); čepeľ elipsovité až obrátene úzko vajcovitá, 2-5,5×0,3-1,3 cm veľká; horné byľové listy sediace, úzko elipsovité, podlhovasté až elipsovité, 0,9-3,6×0,2-0,6 cm