

- 3a Listy na líci a dolná časť byle husto chlpaté; chlpy 3-4-ramenné. Dlhšie tyčinky také dlhé alebo o málo dlhšie ako piestik ..... 1. *E. verna* var. *microcarpa*
- 3b Listy na líci a dolná časť byle husto chlpaté; chlpy prevažne vidlicovité, jedinele 3-ramenné alebo jednoduché. Všetky tyčinky kratšie ako piestik ..... 2. *E. spathulata*

### 1. *Erophila verna* (L.) B e s s e r

Jarmilka jarná

Ic.: Tab. 56, fig. 1, p. 545

*Erophila verna* (L.) B e s s e r Enum. Pl. Volhyn. p. 82, 1822.

Baz.: *Draba verna* L. Sp. Pl., ed. 1, p. 642, 1753.

Syn.: *Erophila vulgaris* D C. 1821, nom. illeg. - *E. draba* K. F. S c h i m p. et S p e n n. 1829.

Jednoročná, 3-15(-25) cm vysoká bylina, na báze s ružicou prízemných listov. Byle v počte 1-6, priame alebo mierne vystúpavé (na priereze okrúhle), v dolnej časti chlpaté, smerom k súkvetiu chlpy ubúda, pod súkvetím a v súkvetí holé (chlpy prevažne 3-4-ramenné, primiešané vidlicovité aj jednoduché), trávovozelené, niekedy v dolnej časti fialkasté. Listy v prízemnej ružici, lopatkovité (najstaršie) alebo kopijovité, na báze zúžené, celistvookrajové alebo nepravidelne zúbkaté, na vrchole končisté. Strapce 3-25(-30)-kveté. Kvety stopkaté, drobné, stopky kvetov od vretena súkvetia odstavajúce až vzpriamené. Kališné lístky vajcovité, 1-2 mm dlhé, zelené, na okraji s blanitým bielym alebo ružovkastým lemom, neblanitá zelená časť riedko chlpatá (chlpy jednoduché) alebo holá. Korunné lupienky široko obrátene vajcovité, 2-dielne (po dolnú 1/3-1/2 delené širokým, obrátene trojuholníkovitým zárezom), biele. Semenník krčiažtekovitý až vajcovitý, na vrchole s krátkou, hrubou čnelkou; blizna zvrchu okrúhlastá, plochá. Tyčinky nerovnako dlhé. Šešuľky v obryse podlhovasté, elipsovité, obrátene kopijovité alebo okrúhlasté (var. *microcarpa*), (3-)5-10×1-3 mm veľké, po vypadnutí semien pretrváva niekoľko dní blanitá (priesvitná) priehradka. Semená početné (vyše 50 v jednej šešuľke), drobné, hnedé.

C h r o m o z ó m y:  $2n = 36$ , okr. 5, Bratislava, časť Devín [M u r í n in M u r í n et F e r á k o v á Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 33: 41, 1986 ut var. *microcarpa* (W i b i r a l) M a r k g r.]

V a r i a b i l i t a. V tomto chápaní druhu je variabilita veľká. Uvádza sa viac mikrodrohov alebo poddrohov či variet. Najvýraznejšie znaky sú: tvar a veľkosť šešuľky, typ a tvar chlpy, zastúpenie rôznych typov chlpy a hustota ochlpenia dolnej časti byle, lícnej strany listov a kališných lístkov. Podľa kombinácie uvedených znakov je možné odlišiť tieto variety:

- var. *verna* (syn.: var. *krockeri* (A n d r z.) A s c h. et G r a e b n. non O. E. S c h u l z) - šešuľky v obryse podlhovasté až elipsovité (najširšie v strede), 5-7×1,5-3 mm veľké, stopky plodov vzpriamené, korunné lupienky 1,5-2 (-2,5) mm dlhé. U nás najčastejšia, časté prechodné typy k var. *majuscula*