

1. *Cochlearia tatrae Borbás*

Lyžičník tatranský

Ic.: Tab. 56, fig. 3, p. 545

Cochlearia tatrae Borbás Pallas Nagy Lexikona 10: 28, 1875.

Syn.: *Cochlearia pyrenaica* * *tatrae* (Borbás) Ján v. 1924 – *C. pyrenaica* var. *tatrae* (Borbás) Kulcs. 1927 – *Cochlearia officinalis* subsp. *tatrae* (Borbás) Domini 1937.

Trváca bylina, s krátkym viachlavým podzemkom. Byť v čase dokvitania a tvorby plodov (5-)7,5-15(-20) cm vysoká. Prízemné listy v ružici, stopkaté; stopky (2-)3-6(-10) cm dlhé; čepele okrúhlasto obličkovité až srdcovité, celistvé, na báze srdcovité alebo vykrojené, (6-)8,5-15,5(-24)×(10-)12-17(-22) mm veľké; dolné byľové listy podobné prízemným; stredné byľové listy krátko stopkaté; čepele vajcovité až vajcovito kopijovité, na báze srdcovité alebo klinovité; horné byľové listy sediace, na báze srdcovito alebo šípovito poloobjímavé, na okraji zúbkaté. Strapce na začiatku kvitnutia stiahnuté, s postupujúcim odkvitaním a začínajúcou tvorbou plodov mierne predĺžené. Kališné lístky konkávne, vajcovito kopijovité až vajcovité, 2-4×2-3 mm veľké, zelené so svetlým blanitým okrajom. Korunné lupienky široko elipsovité až obrátene vajcovité, s krátkym nechtíkom, 5-7×2-4 mm veľké, smotanovobiele až krémovožlté. Peňnice žlté; peňové zrnka elipsoidné, (27-)28-31(-34)×(20-)22-24(-27) µm veľké. Súplodie v čase zrelosti prevažnej väčšiny plodov (2,5-)3-6(-10) cm dlhé. Šešuľky v obryse elipsovité alebo vajcovité až obrátene vajcovité, smerom k obidvom koncom postupne zúžené, (4-)4,5-6,3(-7)×(3-)3,3-4,4(-6) mm veľké. Stopky plodov od vretena súplodia šikmo (v ostrom uhle 45-60°), zriedkavo kolmo odstávajúce, (1-)1,1-1,4 (-1,6)-krát dlhšie ako šešuľky. Semená sploštené, široko elipsoidné, (1,7-)1,8-2,1 (-2,2)×(1,3-)1,4-1,6(-1,7) mm veľké, hnédé, bradavičnaté.

Chromozómy: $2n = 42$, okr. 23b, Velická dolina (Uhriková in Májovský et al. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 18: 51, 1970).

Nomenklatorická poznámka. Zápalowicz (1912) okrem opisu nových foriem uvádzá tiež podrobnej latinský opis druhu *C. tatrae*, ako aj diagnózu oproti príbuzným druhom *C. pyrenaica*, *C. excelsa* a *C. officinalis*, čím spresnil pôvodný Borbásov veľmi stručný opis v maďarskom jazyku (sám ho chápe ako emendáciu).

Variabilita. Druh variabilný najmä pokiaľ ide o výške a rozkonárenosť biele, veľkosť listov a plodov. Na základe niektorých drobných morfologických odlišností boli opísané viaceré formy (Zápalowicz 1. c.): f. *brevis* Zápal. (nízke rastliny nepresahujúce 6 cm), f. *elatior* Zápal. (robustnejšie rastliny dosahujúce výšku okolo 20 cm) a f. *ramosissima* Zápal. (rastliny už od bázy rozkonárené). S najväčšou pravdepodobnosťou ide však iba o ekomorfózy spôsobené rozdielnymi stanovištnými podmienkami.

Biology, ecology, phytogeography. Hemikryptofyt. Kvítanie júl-september. Entomogamná rastlina. Druh viazaný na spoločenstvá vlh-