

nerozlišovali. Známe sú údaje z Ipeľsko-rimavskej brázdy, Záhorskej nížiny, Podunajskej nížiny a zo Strážovských vrchov. Pravdepodobne sa vyskytoval zriedkavejšie ako nominálny poddruh.

Pannonicum. 1. Chľaba, Veľká dolina (Š í p o š o v á et al. 1999 SAV). 2. Hajnáčka, hradný vrch (H a l l o n o v á 1981 SMBB). 4. Vysoká pri Morave (P t a č o v s k ý 1935 SAV). 6. Bratislava (S c h n e l l e r s. d. SLO).

Carpathicum. 13. Beluša (B r a n c s i k 1899 BRA).

#### 4. *Camelina alyssum* (M i l l.) T h e l l.

##### Laničník taricolistý

*Camelina alyssum* (M i l l.) T h e l l. Verz. Sämer. Früchte Bot. Gard. Univ. Zürich 1906: 10, 1906.

Baz.: *Myagrum alyssum* M i l l. Gard. Dict., ed. 8, sine p., 1768.

Syn.: *Camelina linicola* S c h i m p. et S p e n n. 1829 - *C. sativa* subsp. *linicola* (S c h i m p. et S p e n n.) N. W. Z i n g e r 1908 - *C. sativa* subsp. *alyssum* (M i l l.) T h e l l. 1919.

Jednoročná, ± svetlozelená bylina. Byľ priama, zriedkavo rozkonárená, (15-) 30-70(-90) cm vysoká, väčšinou holá alebo v spodnej časti pokrytá roztrúsenými, pritlačenými, rozkonárenými chlpmi, zriedka primiešané i krátke (do 0,5 mm dlhé) jednoduché chlpy. Listy sediace, podlhovasté alebo kopijovité, na báze uškato alebo šipovito objímavé, celistvookrajové, laločnaté až perovito zárezové, spodné listy ± holé alebo podobne ako byľ chlpaté. Strapce pomerne riedke, ± krátke, 3-15(-25) cm dlhé. Kališné lístky 3-4(-4,5) mm dlhé. Korunné lupienky 4-6(-6,2) mm dlhé, svetložlté. Šešuľky obrátene vajcovité až guľovito hruškovité, v čase zrelosti (3,6-)4-5,5 mm hrubé, 6-12(-12,5)×5-7 mm veľké; chlopne ± mäkké (až neskôr drevnatejúce), so zreteľnou sieťovitou žilnatinou a strednou žilou; stopky plodov priamo až kolmo od vretena súplodia odstavajúce alebo častejšie oblúkovito naspäť ohnuté až často sprehybané, 10-30(-40) mm dlhé; čnelka na plode 1/4-1/3 taká dlhá ako šešuľka. Semená 4-18(-20)-početné, 2-3 mm dlhé, žltohnedé až červenkasto hnedé.

T a x o n o m i c k á p o z n á m k a. Niektorí autori považujú oba poddruhy subsp. *alyssum* a subsp. *integerrima* (Č e l a k.) S m e j k a l za samostatné druhy.

C e l k o v é r o z š í r e n i e. Antropofytný druh, v minulosti rozšírený takmer v celej Európe (okrem južnej a juhozápadnej časti) najmä v oblastiach pestovania ľanu, na západe po Veľkú Britániu a Írsko, na severe po 70° severnej zemepisnej šírky, ďalej na západnej Sibíri, Zabajkalsku a v Malej Ázii. Dovozom osív ľanu sa dostal až do Južnej Ameriky (Argentína). Výskyt oboch poddruhov nie je dostatočne známy, v mnohých oblastiach sa ich areály prekrývali. V súčasnosti sa *C. alyssum* s. l. udáva ako vyhynutý taxón vo väčšej časti Európy (cf. J a l a s et al. 1996).

P o z n á m k a. Výskyt súvisí s pestovaním ľanu siateho, na Slovensku však v poslednom období nebol zaznamenaný (vyhynutý?), čo je dôsledok nielen dôkladného čistenia ľanového osiva, ale aj používania herbicidov.