

s prirodzeným areálom v Stredozemí, nebol na Slovensku dosiaľ zaznamenaný, ale vzhľadom na súčasný európsky areál [J a l a s et al. (eds.) 1996] sa jeho výskyt u nás nedá vylúčiť. Odlišuje sa od *C. bursa-pastoris* tvarom plodov (šešulky v obryse široko klinovité, vrchol chlopni už od bázy čnelky doširoka zaokrúhlený, okraje chlopni k vretenu súkvetia konkávne) (S v e n s s o n 1983).

LITERATÚRA

- B o r b á s, V.: A pászortáska fajtai. Varietates *Bursae pastoris*. Magyar Bot. Lapok 1: 17-24, 1902.
- J a l a s, J., S u o m i n e n, J., L a m p i n e n, R. (eds.): Atlas Florae Europaeae 11, *Cruciferae* (*Ricotia* to *Raphanus*), p. 130-133. Helsinki University Printing House, Helsinki, 1996.
- L i n d e, M., D i e l, S., N e u f f e r, B.: Flowering ecotypes of *Capsella bursa-pastoris* (L.) M e d i k. (*Brassicaceae*) analysed by a cosegregation of phenotypic characters (QTL) and molecular markers. Ann. Bot. (Oxford) 87: 91-99, 2001.
- N e u f f e r, B.: Ecotype differentiation in *Capsella*. Vegetatio 89: 165-171, 1990.
- N e u f f e r, B., H u r k a, H.: Variation of growth form parameters in *Capsella* (*Cruciferae*). Pl. Syst. Evol. 153: 265-279, 1986.
- S h u l l, G. H.: *Bursa bursa-pastoris* and *Bursa heegeri*: biotypes and hybrids. Publ. Carnegie Inst. Wash. 112: 1-57, 1909.
- S h u l l, G. H.: Defective inheritance-rations in *Bursa* hybrids. Verh. Naturf. Vereins Brünn. 49: 156-168, 1911.
- S t e i n m e y e r, B., W ö h r m a n n, K., H u r k a, H.: Phänotypenvariabilität und Umwelt bei *Capsella bursa-pastoris* (*Cruciferae*). Flora 177: 323-334, 1985.
- S v e n s s o n, S.: Chromosome numbers and morphology in the *Capsella bursa-pastoris* complex (*Brassicaceae*) in Greece. Willdenowia 13: 267-276, 1983.

37. Teesdalia W. T. A i t o n

Tesdálka

(SPRACOVALA H. ŠÍPOŠOVÁ)

Teesdalia W. T. A i t o n Hort. Kew. 4, ed. 2, p. 83, Dec. 1812.

Syn.: *Iberis* L. 1753 p. p. - *Guepinia* B a s t. Jul. 1812 non Fr. 1825: Fr. 1828.

Jednoročné až dvojročné, holé alebo chlpaté byliny s prízemnými ružicami listov. Byle bezlisté, zriedka s 1-2(-3) drobnými listami, ukončené strapcovitým súkvetím. Listy prízemnej ružice jednoduché, v obryse kopijovité, rôzne delené, zriedka celistvé. Byľové listy drobné, čiarkovito kopijovité. Kvety zygomorfné, vo vrcholových strapcoch. Kališné lístky 4. Korunné lupienky 4, nerovnako veľké. Tyčienik 6, zriedka 4 (2 vnútorné redukované), po bokoch vonkajších tyčieniek po 1 nektáriu. Gyneceum s rovnou krátkou čnelkou. Plody pukavé, kolmo na priehradku sploštené (úzkopriehradkové) krídlaté šešulky; puzdrá 2-semenné; semená drobné; osemenie vo vlhku slizovatie. Kľíček bokovo koreňový.

Do rodu patria 2 druhy s výskytom v západnej, severozápadnej a strednej Európe a v severnej časti Afriky (v strednej Európe len 1), 1 zavlečený aj v Severnej Amerike.