

Nomenklatorická poznámka. Rodové meno *Guepinia* B a s t. bolo publikované tiež v r. 1812 a to v júli. Meno *Guepinia* použil však aj F r i e s pre rod húb v r. 1828; podľa medzinárodného kódu botanickej nomenklatúry (2000, čl. 15) mená, ktoré Fries prijal, sú sankcionované.

Z á k l a d n é c h r o m o z ó m o v é č í s l o : $x = 6$

1. *Teesdalia nudicaulis* (L.) W. T. A i t o n

Tesdálka piesočná

Ic.: Tab. 60, fig. 3, p. 597

Teesdalia nudicaulis (L.) W. T. A i t o n Hort. Kew. 4, ed. 2, p. 83, Dec. 1812.

Baz.: *Iberis nudicaulis* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 650, 1753.

Syn.: *Thlaspi nudicaule* (L.) L a m. et D C. 1805 - *Guepinia nudicaulis* (L.) B a s t. Jul. 1812 - *Capsella nudicaulis* (L.) P r a n t l 1884.

Jednoročná bylina. Koreň úzko vretenovitý. Byle viacpočetné (hlavná a 2-7 vedľajších), priame alebo vystúpavé, 10-20(-30) cm vysoké, holé alebo riedko krátko chlpaté; hlavná byľ jednoduchá, vedľajšie byle zriedka rozkonárené (s 1-2 krátkymi konármi); všetky byle ukončené vrcholovými strapcami. Listy prízemnej ružice v obryse kopijovité, najstaršie (alebo pri veľmi mladých exemplároch) lopatkovité, celistvookrajové, mladšie lýrovito perovito laločnaté až lýrovito perovito zárezové (občas perovito dielne), 1-5 cm dlhé; laloky a úkrojky (diely) na vrchole zaokrúhlené alebo tupé, vrcholový lalok okrúhlastý; byľové listy drobné, sediace, úzko kopijovité, celistvookrajové alebo s 1-2 zúbkami; všetky listy holé alebo roztrúsene krátko chlpaté. Strapce počas kvitnutia na vrchole chocholikaté, počas dozrievania plodov predĺžené. Kvety drobné, stopkaté; stopky kvetov 2-3 mm dlhé. Kališné lístky na vrchole tupé, 1 mm dlhé, zelené, na okraji s úzkym bielym lemom. Korunné lupienky úzko elipsovité, ca 1 mm dlhé, nerovnako veľké (2 väčšie, 2 menšie), biele. Tyčinky dlhšie ako korunné lupienky (vyčnievajú z kvetu); nitky na báze rozšírené. Semenník s krátkou čnelkou. Stopky plodov priame alebo oblúkovito nahor ohnuté, 3-4 mm dlhé, pod šesľou golierovito rozšírené; šesľky v obryse obrátene srdcovito okrúhlasté, také dlhé ako široké, 3-4 mm veľké, kolmo na priehradku sploštené (úzko priehradkové), na vnútornej strane od vretena súplodia ploché až mierne preliačené, na vonkajšej strane vypuklé, po obvode chlopni úzko krídlaté, na vrchole šesľky krídla širšie a vzpriamené (vzpriamené vrcholy krídel a zakrivenie šesľky dodáva plodom „lyžicovitý“ tvar); čnelka na plode neprečnieva krídla (len pri nezrelých plodoch môže byť čnelka dlhšia). Semená široko vajcovité, sploštené, drobné (1-1,2 mm), bledohnedé, hladké.

C h r o m o z ó m y : $2n = 36$ (extra fines).

V a r i a b i l i t a. Rastliny málo variabilné, odchýlky v hustote odenia a v type delenia listovej čepele. Husto chlpaté rastliny, ktoré sa označujú ako f. *hirsuta* R c h b., neboli na Slovensku zistené.