

LITERATÚRA

- Dvořáková, M.: *Lepidium* L. In: Hejný, S., Slávik, B. (eds.), Květena České Republiky 3, p. 185-194. Academia, Praha, 1992.
- A d l e r, W. et al.: Exkursionsflora von Österreich (*Lepidium*, p. 610-612). Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, Wien, 1994.
- Hejný, S., Jehlík, V. (eds.): Karanténny plevele Československa. Studie ČSAV 8: 116-123, 1973.
- Jehlík, V. (ed.): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. Academia, Praha, 1998.
- K m e ř o v á, E.: *Lepidium densiflorum* (L.) S c h r a d. versus *L. virginicum* L. (Identifikačná a chorologická problematika). Acta Envir. Univ. Comen. 10: 63-66, 2000.
- M a r k g r a f, F. (ed.): *Lepidium* L. In: Hegi, G., Illustrierte Flora von Mitteleuropa 4/1, ed. 2, p. 401-419. Verlag Parey, Berlin, Hamburg, 1975.

45. *Cardaria Desv.*

Vesnovka

(SPRACOVALA E. KMEŤOVÁ)

Cardaria Desv. J. Bot. Agric. 3: 163, 1815 („1814“).Syn.: *Lepidium* sect. *Cardaria* (Desv.) DC. 1821.Z á k l a d n é c h r o m o z ó m o v é č í s l o : $x = 8$ 1. *Cardaria draba* (L.) Desv.

Vesnovka obyčajná

Ic.: Tab. 65, fig. 2, p. 657

Cardaria draba (L.) Desv. J. Bot. Agric. 3: 163, 1815 („1814“).Baz.: *Lepidium draba* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 645, 1753.

Trváca, zvyčajne sivasto chlpatá bylina; chlpy jednoduché. Koreň hrubý, povzratý, v hornej časti bohato rozkonárený, siahajúci aj do veľkej hĺbky; podzemné koreňové výhonky dlhé, vytvárajúce sterilné i fertillné byle. Byľ vzpriamená, husto listnatá, nevýrazne hranatá, (20-)30-50(-70) cm vysoká, krátko pritlačene chlpatá; chlpy 0,1-0,3 mm dlhé, smerujúce nadol. Prízemné a dolné byľové listy stopkaté, obrátene vajcovité, hlboko laločnaté až lýrovito perovito dielne, v čase kvitnutia zvyčajne už zaschnuté; stredné a horné byľové listy sediace, podlhovasto elipsovité alebo podlhovasté, až 10×1-3 cm veľké, na báze srdcovité alebo šípovité, objímavé, na okraji spravidla oddialene laločnato zúbkaté, zvlne-