

Cardaria chalepensis (L.) L a n d.-M a z z. Od *Cardaria draba* sa líši šesťkami po obvode priehradky nezaškrtenými, s klinovitou, uťatou alebo zaokrúhlenou, nikdy však srdcovitou bázou listov. Na územie Slovenska by mohol byť zavlečený.

46. Coronopus Z i n n

Vraňonôžka

(SPRACOVAL P. MRÁZ)

Coronopus Z i n n Cat. Pl. Gotting. p. 325, 1757, nom. cons.
Syn.: *Senebiera* D C. 1799.

Jednoročné alebo dvojročné byliny (mimoeurópske druhy aj trváce) s tenkým vretenovitým koreňom. Byľ listnatá. Listy 1-2-krát perovito dielne až perovito strihané, myrozínové bunky pri lyku cievnych zväzkov. Súkvetia vyrastajú zdalivo oproti listom; kvetné strapce krátke, nenápadné, v čase zrelosti plodov iba málo predĺžené. Kvety drobné. Kališné lístky priamo odstavajúce, ružové alebo zelené, so širokým blanitým okrajom, nie sú vakovito vyduté. Korunné lupienky biele alebo žltkasté, vzácné purpurovočervené, alebo chýbajú. Tyčínok 6, niekedy redukované na 4 (2), takmer bez prívěskov; nektárii pri plne vyvinutých kvetoch 6, z toho 4 postavené transverzálne na vonkajšej strane vonkajších - kratších tyčínok, 2 mediálne medzi vnútornými - dlhšími tyčinkami. Semenníky vajcovité až takmer guľovité; čnelka krátka, trváca. Plody nepukavé, hrubostenné, 2-puzdrové šesťky. Šesťky dvojito guľovité alebo obličkovité, kolmo na priehradku mierne sploštené, nerozpadávajúce sa alebo rozpadávajúce sa na dve 1-semenné puzdrá s úzkou štrbinou, cez ktorú však semená nemôžu vypadnúť; oplodie hrubé, tvrdé, sieťovito jamkaté alebo nepravidelne vráskaté, po obvode ostro nerovnako hrebeňovito zúbkaté. Semená vajcovito elipsoidné, žltohnedé; osemenie hladké, vo vlhku neslizovatie. Klíček chrbtovo koreňový.

P o z n á m k a. Rod *Coronopus* sa delí na 4 sekcie podľa tvaru plodu a čnelky, zahŕňa 10 druhov rozšírených od trópov až do polárnych oblastí, niektoré z taxónov sú v dôsledku antropických vplyvov takmer kozmopolitne rozšírené. V Európe je rod zastúpený 3 druhmi. Vedecký aj slovenský názov rodu je odvodený od tvaru listu, ktorý najmä svojím apikálnym koncom pripomína nohu vrany. Od blízko príbuzného rodu *Lepidium* sa líši nepukavými plodmi a neslizovateľným osemením.

Z á k l a d n é c h r o m o z ó m o v é č í s l o: $x = 8$

Kľúč na určenie druhov

- 1a Stopky kvetov a plodov kratšie ako kvety, resp. plody. Korunné lupienky dlhšie ako kališné lístky. Tyčínok 6. Šesťka obličkovitá (na vrchole nevykrojená), zakončená 0,2-0,4 mm dlhou čnelkou. Oplodie hlboko vráska-