

ných plochách) vo všetkých okresoch a podokresoch predkarpatskej flóry a v kotlinách, v horských oblastiach rozšírenie klesá úmerne s absenciou poľnohospodársky využívaných plôch. Vo vysokých Karpatoch výskyt len krátkodobý a náhodný (napr. v okolí chát a turistických chodníkov). Vzhľadom na antropogénny charakter výskytu, nestabilný typ obhospodarovania polí (obmena pestovanej plodiny, používanie herbicidov), ale aj na nedostatočnú herbárovú a literárnu dokumentáciu, sú údaje o rozšírení, resp. o výskyte v tom-ktorom roku veľmi kolísavé.

Len na niekoľkých lokalitách potvrdený (náhodný a nestabilný) výskyt var. *schkuhriana*.

Pannonicum. 8. Velký Horeš (Z á b o r s k ý 1962). - Plešany (M á j o v s k ý 1961). - Brehov, hrad Hečka (M á j o v s k ý 1962).

LITERATÚRA

Ch a t e r, A. O.: *Sinapis* L. In: T u t i n, T. G. et al. (eds.), *Flora Europaea* 1, ed. 2, p. 409-410, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

M a r k g r a f, F. et al.: *Sinapis* L. In: Hegi, G., *Illustrierte Flora von Mitteleuropa* 4/1, ed. 2, p. 467-475. Verlag Paul Parey, Berlin, Hamburg, 1975.

52. Eruca M i l l.

Eruka

(SPRACOVALA V. FERÁKOVÁ)

Eruca M i l l. Gard. Dict. Abr. ed. 4, sine p, 1754.

Syn.: *Brassica* L. 1753 p. p.

Z á k l a d n é c h r o m o z ó m o v é č í s l o: $x = 11$

1. *Eruca vesicaria* (L.) C a v.

Eruka siata

Eruca vesicaria (L.) C a v. Descr. Pl. p. 426, 1802.

Baz.: *Brassica vesicaria* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 668, 1753.

U n á s l e n

subsp. *sativa* (M i l l.) T h e l l.

Eruka siata pravá

Ic.: Tab. 72, fig. 4, p. 719

Eruca vesicaria subsp. *sativa* (M i l l.) T h e l l. in H e g i Ill. Fl. Mitteleur. 4, ed. 1, p. 201, 1918.