

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 126. Na Slovensku ojedinele zaznamenaný neofyt.

Pannonicum. 5. Bratislava, časť Dúbravka, Na vrátkach, neďaleko železničnej trate (Feráková et Záborský 1983 SLO; Záborský et Feráková in Májovský, Murín et al. Karyotax. Prehľ. Fl. Slov. p. 49, 1987).

Poznámka. Ako neofyt sa môže na Slovensku vyskytnúť *Rapistrum rugosum* subsp. *linneanum* Rouy et Foucaud Fl. Fr. 2, p. 73, 1895 [syn.: *Rapistrum linneanum* Boiss. et Reuter 1842, nom. illeg. - *Myagrum hispanicum* L. 1753 - *Rapistrum hispanicum* (L.) Crantz 1769].

Od predchádzajúcich poddruhov sa odlišuje nasledujúcimi znakmi: stopky plodov niťovité, stopky aj s pašešulami od vretena súplodia rovnovážne až naspäť odstávajúce, dolný diel pašešule zakrivený. Pochádza zo Stredozemia, do strednej a západnej Európy prechodne zavliekaný.

LITERATÚRA

- Jalas, J., Suominen, J., Lampinen, R.: Atlas Florae Europaeae 11, *Cruciferae (Ricotia to Raphanus)*. Helsinki University Printing House, Helsinki, 1996.
- Jehlík, V.: *Rapistrum rugosum* (L.) All. - řepovník svraskalý. In: Hejný, S. et al., Karanténní plevele Československa. Studie Českoslov. Akad. Věd 8: 126-131, 1973.
- Markgraf, F. et al.: *Rapistrum* Crantz. In: Hegi, G., Illustrierte Flora von Mitteleuropa 4/1, ed. 2, p. 488-493. Verlag Paul Parey, Berlin, Hamburg, 1975.
- Smekal, M.: Československé druhy rodu *Rapistrum* Crantz. Klub Přírod. Mor. Mus. Brno, Práce Obor. Bot. 1967: 25-30, 1967.

55. Cakile Mill.

Kakila

(SPRACOVALA H. ŠÍPOŠOVÁ)

Cakile Mill. Gard Dict. Abr. ed. 4, sine p. 1754.

Jednoročné, zriedka dvojročné, mäsité, holé, sivo oinovatené byliny. Koreň dlhý (v literatúre sa uvádza až 1 m), úzko vretenovitý. Byľ poliehavá, vystúpavá alebo priama, zväčša už od bázy rozkonárená. Listy stopkaté, dielne až strihané; diely, segmenty stužkovité, zriedka celistvookrajové alebo oddialene nepravidelne zubkaté; v mezofyle myrozínové bunky s chlorofylom. Kvety protandrické v terminálnych (na hlavnej byli i na konároch) bezlisteňových strapchoch; stopka kvetu 1-2,5 mm dlhá. Kališné lístky 4, vajcovité až kopijovité, vakovito vyduté (vonnajšie viac ako vnútorné). Korunné lupienky 4, široko až úzko obrátene vajcovité, s nechtíkom, fialové, ružové alebo biele, husto žilkované. Tyčinky valcovité, žlté; nektária transversálne aj mediánne. Semenník priečne 2-dielny, dolný diel semenníka obrátene kužeľovitý s 1 visiacim vajíčkom, horný diel úzko kužeľovitý, s 1 priamym vajíčkom; blizna sediaca, guľovitá. Plodom je 2-dielna, vreteno-