

1965 SAV). – Stará Lehota – Rúbanica (Bertová et Hubová 1974 SAV). – Stará Lehota, Javorníček (Mucina Českoslov. Ochr. Prír. 19: 160, 1979). – Hrádok, hradný vrch Tematín (Suza 1933 PRC; Kmeťová et Gajarský 1968 SAV; Dvořáková 1969 BRNU; Smejkal 1969 BRNU; Vicherek 1969 BRNU). – Lúka – vrch Ihelník (Sillinger 1929 PR). – Kálnica, kóta 247,4. – Beckov, kóta 247,4 (obe Hrušovská 1983).

### 3. *Helianthemum canum* (L.) Baumg.

#### Deväťorník sivý

Ic.: Tab. 2, fig. 2, p. 43

*Helianthemum canum* (L.) Baumg. Enum. Stirp. Transsilv. 2, p. 85, 1816.

Bas.: *Cistus canus* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 525, 1753.

Syn.: *Cistus vinealis* Willd. 1800 – *Helianthemum vineale* (Willd.) Spreng. 1806 – *Rhodax montanus* var. *canus* (L.) Spach 1836 – *Helianthemum oelandicum* var. *tomentosum* W. D. J. Koch 1835 – *Rhodax canus* (L.) Fuss 1866 – *Helianthemum oelandicum* subsp. *vineale* (Willd.) Čelak. 1867 – *H. marifolium* var. *canum* (L.) Grosser 1903 – *H. oelandicum* subsp. *canum* (L.) Bonnier 1912.

Poloker, (3–)10–20(–25) cm vysoký. Stonky viacpočetné; kvitnúce stonky vzpriamené alebo vystúpavé, riedko alebo pri vrchole husto pritisnuto chlpaté, v hornej časti až sivo plstnaté; chlpy zväzkovité, zväčša nežliazkaté; sterilné stonky rozprestreté, na báze poliehavé, na vrchole vystúpavé. Listy dlho stopkaté, stopka až 10 mm dlhá, zriedkavo všetky listy sediace a poloobjímavé, čiarkovité až kopijovité alebo úzko obrátene vajcovité, 10–20×1,5–4 mm veľké, na líci zelenkasté, roztrúseno zväzkovito chlpaté, na rube a na okraji pritisnuto bielo- až sivoplstnaté, so značne vyčnievajúcou hlavnou žilou a s mierne vyčnievajúcimi bočnými žilami. Kvety v jednoduchých, zriedkavo na báze rozkonárených, 3–10(–15)-kvetých strapcovitých závinkoch; kvetné púčiky kužeľovité, tupé alebo krátko končisté. Vonkajšie 2 kališné lístky čiarkovito kopijovité, tupé alebo končisté, také dlhé alebo kratšie ako vnútorné; vnútorné 3 kališné lístky široko vajcovité, s výraznými súběžnými žilami, na ploche husto hviezdovito plstnaté, na žilách pokryté dlhšími jednoduchými odstávajúcimi alebo vzpriamenými, zriedkavo pritisnutými chlpmi. Lupienky elipsovité až obrátene vajcovité, 3–6(–8)×3–4,5 mm veľké, až 2-krát dlhšie ako kalich, tmavožlté, zriedkavo žltkastobiele. Stopka plodu vzpriamená alebo kolmo odstávajúca, zriedkavo naspäť ohnutá. Tobolka 3-hranná, vajcovito guľovitá, 4,5–6 mm dlhá, ± chlpatá až husto chlpatá, svetlohnedá, mnohosemenná; semená guľovitá až tupo hranatá, na povrchu jemne bradavičnaté alebo hladké, červenohnedé.

Chromozómy:  $2n = 22$ , okr. 10, Pustá Ves (Murín in Májovský et al. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 26: 34, 1978); Plavecké Podhradie, Pohanská hora (Šusteková 1997 in: Marhold et al. (eds.) Chromosome Numb. Survey Ferns Flow. Plants Slovakia, p. 300, 2007).