

5. *Elatine triandra* Schkuhr

Elatinka trojtyčinková

Ic.: Tab. 3, fig. 5, p. 65

Elatine triandra Schkuhr Bot. Hanb. 1, p. 345, 1791.

Jednoročná, drobná obojživelná bylina; byl' plazivá, bohato rozkonárená, 1,5–7(–10) cm dlhá, v uzloch zakoreňujúca, holá. Listy kratučko stopkaté, protistojné, podlhovasto elipsovité, zbiehavé do stopky, na vrchole tupé, 5–10×1–2 mm veľké, svetlozelené, holé; stopka 0,2–0,5 mm dlhá. Prílistky čiarkovité, ca 0,5 mm dlhé, opadavé. Kvety v pazuchách listov jednotlivé, sediace, 3-početné. Kalich od bázy do 1/4 zrastený; zuby kalicha obrátene vajcovité, tupé, 0,5–1 mm dlhé, blanité. Korunné lupienky obrátene vajcovité až široko vajcovité, o málo dlhšie ako kalich, svetloružové. Tyčinky 3. Semenník 3-puzdrový. Tobolky ± guľovité, v priemere 1,5–2 mm; semená valcovité, 0,5–0,7×0,2 mm veľké, mierne prehnuté, bez výrazných pozdĺžnych rebier, priečne políčkovito skulptúrované.

Chromozómy: $2n = ?$

Biológia, ekológia, fytoecenológia. Terofyt. Kvitnutie jún–september. Piesočnaté až hlinité bahňité pôdy, močaristé, bahňité a plytko zaplavované stanovištia a okraje rybníkov a jazier. Druh má fytoecenologickú príslušnosť radu *Nanocyperetalia*.

Celkové rozšírenie. Západná Európa okrem Britských ostrovov, na severe do Švédska, východne až do okolia Moskvy. Južne severné Taliansko, severný Balkán až po Bulharsko. Izolovane na Azorských ostrovoch a tiež vo všetkých ostatných svetadieloch.

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 9. Zo Slovenska sú známe iba literárne údaje bez herbárových dokladov. Taxón vyžaduje ešte ďalšie štúdium.

Pannonicum. 8. Kráľovský Chlmec, úpätie vrchu Tarbucka (Černocho Zborn. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy 11/2: 15, 1965). – Streda nad Bodrogom – Somotor, močiar Tajba (Černocho l. c.). – Kráľovský Chlmec – Malý Horeš [Černocho et Šourek 1954 in Černocho Biológia (Bratislava) 15: 811, 1960]. – Leles (Černocho et Šourek 1954 in Černocho 1960 l. c.). – Vojany (Černocho 1965 l. c.).

Ochrana. Kategória ohrozenia **Ex?** (vyhynutý?). Zákomom chránený.