

8b Kvety s priemerom 70–110 mm. Úponky 2–3-krát rozkonárené, zriedka rastliny bez úponiek. Peľnice všetky spojené. Semená ploché, široko až úzko vajcovité

..... 6. Cucurbita

1. *Thladiantha Bunge*

Žudrovka

(Spracoval P. ELIÁŠ jun.)

Thladiantha Bunge Enum. Pl. China Bor. p. 29, 1833.

Trváce, dvojdomé bylenné liany, s dlhými hľuzovitými koreňmi. Byle popínavé, s úponkami; úponky jednoduché alebo rozkonárené na 2–3 ramená. Listy srdcovité. Tyčinkové kvety jednotlivé alebo v dlho stopkatých vrcholíkoch, kalich zvončekovitý, 5-početný, zrastený, cípy von vyhnuté, koruna z 5, často nerovnakých, voľných lupienkov; voľných tyčiniek 5. Piestikové kvety jednotlivé alebo v krátkom strapci po 2–3, kalich 5-početný, zrastený, koruna 5-početná, lupienky zrastené iba na báze, staminódií 5, nitkovitých blizien 5, semenník s početnými vajíčkami. Plod mnoho-semenná bobuľa s tvrdým vonkajším a mäsitým vnútorným oplodím.

Do rodu patrí asi 20 druhov rozšírených vo východnej Ázii, na Slovensku sa vyskytuje 1 introdukovaný druh.

Základné chromozómové číslo: $x = 9$

1. *Thladiantha dubia Bunge*

Žudrovka pochybná

lc.: Tab. 13, fig. 1, p. 197

Thladiantha dubia Bunge Enum. Pl. China Bor. p. 29, 1833.

Byle 0,6–3 m dlhé, popínavé, hranaté, rozkonárené, s jednoduchými úponkami, husto odstavajúco krátko chlpaté. Listy srdcovité až široko vajcovité, na vrchole končisté, vrúbkovane zubaté, ochlpené podobne ako byl'; žilnatina na rube výrazne vystúpená, horné listy sa postupne zmenšujú do listeňov. Tyčinkové kvety jednotlivé, dlho stopkaté, stopky 25–40(–80) mm dlhé, vyrastajúce z pazúch listeňov, v priemere 15–30(–45) mm veľké; kališné zuby čiarkovito kopijovité, naspäť odstavajúce, koruna široko lievikovito zvončekovitá, zlatožltá, cípy úzko vajcovité, nerovnaké,