

et Gulová 1953 SAV). – Martin, Bukovina (K meř 1907 BRA). – Turčianska Štiavnička, park (Birková 1974). **26a.**, **26b.**, **27a.**, **27b.** Mnoho lokalít. **28.** Kubínska hoľa (Grebenščikov 1954 SAV). – Oravská Jasenica (Jurko Biol. Práce Slov. Akad. Vied 10/6: 53, 1964). – Hruštín – Oravský Podzámok. – Rudina. – Dubie. – Kysucké Nové Mesto, časť Radoľa. – Budatínska Lehota. – Oškerda (všetko Falťanová 1972). – Ladonhora (Magic Táb. Ochr. Prír. XIII., Prehľ. Odb. Výsl. p. 21, 1978). – Kuzminovo. – Predný Krnač. – Bziny. – Medzibrodie nad Oravou – Pribiš. – Studená dolina (všetko Chrtek et Křisa Acta Univ. Carol., Biol. 1971: 396, 1971). – Suchý Hrádok (J. Michalko 1975). – Slaná voda – hájovňa Rovné (Migra 1977). – Nižná, vrch Ostražica (Vicherek 1967 BRNU). **29.** Mnoho údajov. **30a.** Sabinov, breh rieky Torysa (Dočolomanský 1957 BRA). – Prešov – Malý Šariš – Župčany [Jurko Biológia (Bratislava) 20: 57, tab. 1, 1965]. – Prešov, vrch Stráž (J. Michalko 1970). – Sabinov, les Bikoš (Ščavnický 1967). – Demjata, medzi Heďkou a kopčekom Pod pece (L. Dostál Zborn. Východoslov. Múz. Košice, Sér. B, 18: 146, 1977). – Brezovica nad Torysou (Margitai 1937b: 107). **30b.** Kyjov, masív Minčol. – Livovská Huta, dolina Krížovského potoka. – Livovská Huta, Poloninky. – Záhrady [všetko Kliment Ochr. Prír. (Banská Bystrica) 16: 111, 1998]. – Červená Voda (Griserová 1961 BRA). **30c.** Udavské (Šaláta 1940 SLO). – Pichne, vrch Trstianec (Soják 1960 PR). – Benkovce, vrch Inovec. – Benkovce, Zadné paseky. – Komárany, vrch Lipová. – Vyšný Kazimír, Lysá hora (všetko E. Králik 1977). **31.** Mnoho údajov.

#### 14. *Campanula rapunculus* L.

##### Zvonček repkový

Ic.: Tab. 28, fig. 1, p. 305

*Campanula rapunculus* L. Sp. pl., ed. 1, p. 164, 1753.

Dvojočná bylina. Koreň repovito zhrubnutý. Byľ jednoduchá, rozkonárená niekedy trsovitá, vzpriamená, (36–)49–107(–112) cm vysoká, tuhá, v dolnej časti sivozelená, roztrúsene odstavajúco dlho chlpatá, smerom k vrcholu sýtozelená, riedko chlpatá až holá, zreteľne ryhovaná, tupo hranatá. Byľové listy v dolnej časti byľe stopkaté, elipsovité, na báze zbiehavé, vrúbkovane zúbkaté, na okraji mierne zvlnené, na vrchole končisté, (32–)40–75(–80)×6–13(–16) mm veľké, na rube aj na líci roztrúsene až riedko chlpaté alebo na líci holé a na rube riedko chlpaté alebo najmä na strednej žile husto štetinkato chlpaté, sivohnedé. Listy v strednej časti stonky sediace, úzko elipsovité, na báze klinovité alebo uťaté, takmer objímavé, oddialene slabo zúbkaté, na okraji mierne zvlnené, na vrchole končisté, (25–)27–45(–47)×3–8(–9) mm veľké, roztrúsene až riedko chlpaté alebo na líci holé a na rube najmä na strednej žile husto odstavajúco chlpaté, sivozelené. Súkvetie riedky vrcholový strapiec alebo úzka mnohokvetá metlina (stopky kvetov a konáre metliny tuhé, priamo odstavajúce). Listene na báze hlavného súkvetia úzko trojuholníkovité, oddialene jemne zúbkaté, na báze s 2 výraznými zubmi, na vrchole dlho končisté, 11–17(–18)××1–2 mm veľké, holé alebo na rube najmä na strednej žile husto chlpaté. Stopky kvetov 2–4,5(–5) mm dlhé, holé. Kvetná čiaska ryhovaná, úzko elipsovité, 3–6×2–3