

*Gagea busambarensis* Parl. fl. palerm. 1. p. 279.

*Ornithogalum busambarense* Tin. in Guss. syn. fl. sic. 2. p. 813.  
in add. et emend.

**Figura.** — Nessuna.

**Stazione, Abitazione e Fioritura.** — Il Prof. Tineo ha trovato nel mese di Marzo una sola pianta di questa specie in luoghi erbosi e pietrosi del Monte Busambra, sotto l'agugghia, in Sicilia.

**Distribuzione geografica.** — Pianta per ora nota del luogo qui sopra indicato.

**Osservazioni.** — Specie dubbia e da essere forse considerata come una forma o varietà di una delle specie siciliane superiormente descritte. Il Prof. Tineo scrive che essa è una piccola pianta, alta un pollice, e che, oltre ai caratteri notati nella diagnosi riportata di sopra, si distingue dalla *Gagea saxatilis* per i fiori il doppio più grandi, per le foglioline del perigonio non rigate di verde di fuori, per la fioritura più sollecita e per lo scapo con un solo fiore.

## TRIBÙ SECONDA.

### ASFODELEE.

ASPHODELEÆ Parl.

ASPHODELI Juss. gen. p. 51.

LILIACÉES, second ordre ASFODÈLES Dec. fl. franç. 3. p. 204.

ASPHODELEÆ genera A. YUCEA, B. HEMEROCALLIDEA, C. ANTHERICEA,  
D. SCILLEA Bartl. ord. nat. p. 50.

LILIACÉÆ, subordo II AGAPANTHÉÆ, III ALOINEÆ, IV ASPHÓDELEÆ  
Endl. gen. pl. p. 141, 143, 144.

ASPHODELEÆ Kunth enum. pl. 4. p. 280.

LILIACÉÆ trib. II<sup>a</sup> HEMEROCALLIDEÆ, III<sup>a</sup> ALOINEÆ, IV<sup>a</sup> SCILLEÆ, et V<sup>a</sup> AN-  
THERICEÆ Lindl. veg. kingd. p. 205.

Herbæ bulbosæ vel radice fibrosa aut tuberosa tantum præditæ.  
Scapus vel caulis plerumque multiflorus, raro pauciflorus, floribus  
racemosis, spicatis, corymbosis vel umbellatis, singulis basi uni-bi-