

950. *Ophrys pallida* Raf.

O. spica 2-4 raro 5-6flora, perigonii phyllis exterioribus ovato-ellipticis, margine revolutis, lateralibus patentibus, obtusis, intermedio erectiusculo, obtusissimo, binis interioribus paulo brevioribus, sublinearibus, truncatis obtusisve vel submucronulatis, glabris, labello dependente, obovato, convexiusculo, basi gibbosiusculo, velutino, basi luteo-albo, macula unica nitida notato (Guss.), ad medium trilobo, lobis lateralibus oblongis, obtusis, reflexo-recurvatis, lobo medio majore et longiore, rotundato, subintegro, gynostemio brevissimo, obtuso, bracteis ovato-oblongis, obtusis, concavo-canaliculatis, ovarium superantibus, fibris radicalibus tuberosis 2 indivisis.

Ophrys pallida Raf. *caratt.* p. 87 *Guss. syn. fl. sic.* 2. p. 550 an excl. syn. *Ophryd. Pectus* Mutel. *Bert. fl. ital.* 9. p. 596.

Arachnites pallida *Todar! orchid. sic.* p. 100.

Orchis fusca 2 *pallida* *Reich. fil. orchid.* p. 73.

Orchis myodes minor seu *minori macriorique flore cinereo* *Cup. h. cath. suppl. p.* 249.

Orchis myodes seu *minori macriorique flore cinereo-atropurpureo* *Cup. h. cath. suppl. alt. p.* 67.

Figure.—*Todar. l.c. tab. 1. f. 11, 12. Reich. fil. orchid. tab. 443. f. 3.*

Orchis myodes galea et alis herbidis *Cup. panph. 2. tab. 163. Bonann. tab. 29.*

Stazione, Abitazione e Fioritura. — Nei luoghi boschivi dei poggi e monti di Sicilia nella regione del castagno e della querce. Presso Palermo nel Monte Pizzuta, nel Monte Renda, nel Monte Occhio, presso Misilmeri al Piano della Stuppa, Marineo, Ficuzza nel Bosco del Cappelliere e nel Monte Busambra, nella maggior parte dei quali luoghi l'ho raccolta io stesso, però non ho trovata la descrizione fattane allora sulle piante fresche. Nasce pure presso Prizzi (Gerv. mss.). Fiorisce in Aprile e Maggio.

Distribuzione geografica. — Specie siciliana.

Osservazioni. — È pianta certamente distinta dalla *Ophrys fusca* della quale Reichenbach figlio ne ha fatta una semplice varietà. Si distingue facilmente a prima vista per essere più piccola, per i fiori più piccoli e di color bianco-gialliccio, per il labello quasi come inginocchiato e diretto quasi in giù, per il lobo intermedio intero o quasi intero, e per altri caratteri.