

*3-nerviis viscidis corollam superantibus: leguminibus calyce brevioribus.* ☉. *In arenosis maritimis. Fl. Majo.*

Raíz perpendicular, fibrosa, que arroja varios tallos difusos ó ascendentes terminados por cabezuelas de pocas flores rosadas, peloso-glandulosos como las hojas y cálices. Hojas brevemente pecioladas, compuestas de 3 foliolos trasovados, finamente aserrados; el intermedio doble mayor que los laterales y todos 3 sentados. Estípulas aovadas, dentadas. Lacinias del cáliz anchas, lanceoladas, trinervias, mas largas que la corola. Estandarte algo escotado. Legumbres mas cortas que el cáliz.

Hab. en Marbella y Estepona (Boiss.)

*O. ALOPECUROIDES. L. sp. pl. 1008. Schkr. handb. tab. 194. Rchb. l. c. tab. 44. Caule solitario erecto subvillosa: fol. unifol. folio elliptico obtuso stipulisque maximis subserratis: floribus densè spicatis: calycinis lobis hispidis corollâ et legumine duplò ferè longioribus.* ☉. *In campis et arvis. Fl. Majo, Junio.*

Raíz anual que lleva un solo tallo de 2-4 decím., pelosito, sencillo ó poco ramoso, derecho, con hojas sencillas, casi lampiñas, grandes, ovales, obtusas ó escotadas, denticuladas, insertas sobre una vaina biauriculada y tanto mayores cuanto mas baja es su posicion. Flores pequeñas, rojizas, agrupadas formando espiga terminal, densa y foliosa, con las hojas florales oblongas ó lineares, armadas de 3-5 dientes agudos. Lacinias del cáliz estriado lanceoladas, puntiagudo-setáceas. Corola igual en longitud ó mas corta que el cáliz. Legumbre oval, pelosa en su ápice, una mitad de corta que el cáliz.

Hab. en los reinos de Valencia, Murcia y Andalucía.

*O. SALZMANNIANA Boiss. et Reut. pugil. pl. nov. hispan. p. 54. O. monophylla. Boiss. voy. bot. p. 154, (non Desf.) O. alopecuroides var. trifoliolata. Coss. et Bourg. pl. hisp. exsicc. 1849. Caulibus erectis glabriusculis vel parcè lanatis: stipulis in unam oblongo-linearem amplexicaulem connatis: foliis inferioribus unifoliolatis, superioribus sub racemo trifoliatis, foliolis oblongis vel oblongo-linearibus serrulatis: bracteis ciliato-lanatis calyces longè superantibus: floribus in spicam ovatam densè confertis.* ☉. *In arvis et incultis. Fl. Majo, Junio.*

Planta anual, con tallos herbáceos, derechos, casi lampiños ó