

5-nerviis viscidis corollam superantibus: leguminibus calyce brevioribus. ☉. *In arenosis maritimis. Fl. Majo.*

Raíz perpendicular, fibrosa, que arroja varios tallos difusos ó ascendentes terminados por cabezuelas de pocas flores rosadas, peloso-glandulosos como las hojas y cálices. Hojas brevemente pecioladas, compuestas de 3 foliolos trasovados, finamente aserrados; el intermedio doble mayor que los laterales y todos 3 sentados. Estípulas aovadas, dentadas. Lacinias del cáliz anchas, lanceoladas, trinervias, mas largas que la corola. Estandarte algo escotado. Legumbres mas cortas que el cáliz.

Hab. en Marbella y Estepona (Boiss.)

O. ALOPECUROIDES. *L. sp. pl.* 1008. *Schkr. handb. tab.* 194. *Rchb. l. c. tab.* 44. *Caule solitario erecto subvillosa: fol. unifol. folio elliptico obtuso stipulisque maximis subserratis: floribus densè spicatis: calycinis lobis hispidis corollá et legumine duplò ferè longioribus.* ☉. *In campis et arvis. Fl. Majo, Junio.*

Raíz anual que lleva un solo tallo de 2-4 decim., pelosito, sencillo ó poco ramoso, derecho, con hojas sencillas, casi lampiñas, grandes, ovales, obtusas ó escotadas, denticuladas, insertas sobre una vaina biauriculada y tanto mayores cuanto mas baja es su posicion. Flores pequeñas, rojizas, agrupadas formando espiga terminal, densa y foliosa, con las hojas florales oblongas ó lineares, armadas de 5-5 dientes agudos. Lacinias del cáliz estriado lanceoladas, puntiagudo-setáceas. Corola igual en longitud ó mas corta que el cáliz. Legumbre oval, pelosa en su ápice, una mitad de corta que el cáliz.

Hab. en los reinos de Valencia, Murcia y Andalucía.

O. SALZMANNIANA Boiss. et Reul. *pugil. pl. nov. hispan. p.* 54. *O. monophylla. Boiss. voy. bot. p.* 154, (non Desf.) *O. alopecuroides var. trifoliolata. Coss. et Bourg. pl. hisp. exsicc.* 1849. *Caulibus erectis glabriusculis vel parcè lanatis: stipulis in unam oblongo-linearem amplexicaulem connatis: foliis inferioribus unifoliolatis, superioribus sub racemo trifoliatis, foliolis oblongis vel oblongo-linearibus serrulatis: bracteis ciliato-lanatis calyces longè superantibus: floribus in spicam ovatam densè confertis.* ☉. *In arvis et incultis. Fl. Majo, Junio.*

Planta anual, con tallos herbáceos, derechos, casi lampiños ó