

*lis oblongo-linearibus 5-8-jugis: pedunculis folio paulò brevioribus: leguminibus capitato-stellatis tereti-compressis, adpressè villosis, basi subdilatis, loculis 5-7-spermis. ☉. In gypsaceis. Fl. Majo.*

Esta especie, natural del Egipto y de la Iberia, ha sido hallada por Bourgeau en terreno yesoso del territorio de Hellin en el reino de Murcia, donde crece tambien la *Malva aegyptiaca* L., y probablemente no es mas que una variedad de la especie anterior con la que fué confundida por Bieberstein, en su flora ibérica-tauro-caucásica, y cuya diferencia estriba en ser las estípulas lanceoladas; las hojas compuestas de 5-8 pares de foliolos linear-oblongos, aguditos; los pedúnculos un poco mas cortos que la hoja, y las legumbres rollizo-comprimidas, algo dilatadas por su base, cubiertas de vello echado, extendidas en forma de cruz, llevando 5-7 semillas en cada celda.

A. CYMBECARPOS. *Brot. fl. lusit. 2, p. 167; et phyt. lusit. pag. 145, tab. 159. Herbaceus procumbens subvillosus: foliolis obcordato-cuneatis: pedunculis folii longitudine: leguminibus glabris rugoso-verrucosis rostratis arcuatis, basi tumidoribus. ☉. In sabulosis et argillosis. Fl. Majo.*

Planta veloso-pelosa de 1-5 decim., de cuya raíz fibrosa anual salen tallos tendidos circularmente, que llevan hojas compuestas de 10-12 pares de foliolos acorazonado-inversos, casi cuneiformes ú oblongos en las hojas superiores, lampiños por su haz, pubescentes por el envés, escotados profundamente en su ápice. Estípulas aovado-puntiagudas, pestañosas, pubescentes por la cara externa, casi abrazadoras del tallo. Pedúnculos axilares, angulosos-asurcados, tan largos como la hoja, terminados por 4-5 flores casi sentadas, adornadas de brácteas lanceolado-agudas tan largas como el cáliz. Dientes calicinos recurvados, casi iguales entre sí y la mitad de cortos que el tubo. Estandarte elíptico, escotado-apiculado. Alas oblongas, enteras. Legumbre lampiña, encorvada, ensanchada en su base, desde la que va adelgazándose gradualmente hasta el ápice curvo-aleznado, verrugoso-arrugada por la superficie y recorrida de un profundo surco en su borde inferior. Semillas arriñonadas, algo comprimidas y arrugaditas, 10-12 en cada celda.