

su márgen. Pétalos blancos, doble de largos que el cáliz. Caja de 6 valvas. Semillas ásperas, muy deprimidas, convexo-cóncavas.

Comun en toda España.

CERASTIUM. (L. GEN. 585.)

Secc. 1.^a *Strephodon*. Ser. in DC. prod. 1, p. 414. Caja cilíndrica y los dientes enroscados despues de la dehiscencia.

C. PERFOLIATUM. L. sp. pl. ed. 5, p. 627. Dill. hort. elth. tab. 217, fig. 284. Wilk. ic. pl. nov. pag. 82, tom. 1, tab. 56, fig. A. Annuum, caule stricto simplici vel inde à basi ramoso, fistuloso, nodoso, glaberrimo uti rami ac pedunculi; foliis inferioribus lanceolatis, mediis ovato-lanceolatis, superioribus latè ovatis, omnibus basi in tubum subventricosum connatis, pilis brevibus tuberculosis instructis, margine ciliatis: cymâ terminali dichotomâ subumbellatâ: sepalis ovalibus glabris, venosis nervoque medio valido percursis, margine angustè scariosis; petalis calyce brevioribus bifidis; staminibus 10; capsulæ rectæ conico-truncatæ sulcatæ dentibus brevibus circinnatis; seminibus triangulari-reniformibus tuberculosis. ☉. In campis, ad agrorum margines. Fl. Mayo, Junio.

Raíz fibrosa, anual, de la que sale un tallo perpendicular, fistuloso, de 1-4 decím., sencillo ó ramificado desde su base y las ramas filiformes, derechas ó ascendentes, muy lampiñas, como tambien los pedúnculos. Hojas inferiores lanceoladas, mas largas que los entrenudos; las intermedias aovado-lanceoladas y las superiores anchas, aovadas; unas y otras mas cortas que los entrenudos, pero todas trabadas formando en su base un tubo algo ventrudo, enteras, algo carnosas, tuberculado-pelosas, venosas y recorridas de un grueso nervio. Flores dispuestas en cima terminal, dicótoma, casi umbelada. Sépalos ovales, ligeramente escotados, angostamente escariosos por su márgen, uninerves, lampiños. Pétalos blancos, mas cortos que el cáliz, lanceolados, bífidos y las lacinias agudas. Caja aovado-cónica, truncada, recta, asurcada y los dientes enroscados. Semillas discoideas, triangular-arriñonadas, cubiertas de tubérculos cónicos.