

Lám. 888.-a-i) *Genista pumila* subsp. *pumila*; j-r) *G. pumila* subsp. *rigidissima*.

- Planta 0,05-0,2 m de altura; órgano estipular de los tallos viejos truncado o redondeado en el ápice, rara vez bidentado; ovario con 5 rudimentos seminales ..... **b. subsp. rigidissima**


**a. subsp. pumila** [lám. 888a-i]. Matorrales xerofíticos, sobre calizas, yesos o margas; 400-1700(2130) m. IV-V(VII). ● SE de la Península Ibérica. **Esp.:** A Ab Al CR Gr J Mu To V.

**b. subsp. rigidissima** (Vierh.) Talavera & L. Sáez [lám. 888j-r]. Páramos calcáreos; 900-1300(1650) m. V-VI(VII). ● C de la Península Ibérica. **Esp.:** Cs Cu Gu So Te Z.


**6. G. pulchella** Vis. [lám. 889a-i]. Crestones descarnados y pedregales calizos; (600)800-1400 m. VI-VII. Francia, Albania, Yugoslavia y Península Ibérica. N de España. **Esp.:** Bu Na Vi.

**7. G. legionensis** (Pau) M. Laínz [lám. 889j-r]. Matorrales pulviniformes, generalmente sobre calizas; (50)1100-2200 m. (V)VI-VIII. ● E de la Cordillera Cantábrica, más una localidad aislada en la costa vizcaína. **Esp.:** Bi Le O P S. **Observaciones.**-[ver Flora ibérica VII(I), pág. 64].

**8. G. polyanthos** R. Roem. ex Willk. [lám. 890a-i]. Jarales, sobre suelo pizarroso o granítico; (5)100-1080 m. II-IV(VI). ● SW de la Península Ibérica, desde Sierra Morena hasta el Algarve portugués. **Esp.:** Ab Ba Co CR H J Se. **Port.:** Ag BAL. **Observaciones.**-[ver Flora



Lám. 889.-a-i) *Genista pulchella*; j-r) *G. legionensis*.



Lám. 890.-a-i) *Genista polyanthos*; j-r) *G. hystrix*.