

1886. *Jungermannia bicuspidata* L. — Verde, blanquecina ú ocrácea, blanda, tendida, con ramas erguidas de 5'''-10'''; hojas extendido-erguidas, cóncavas, ovales, hendidas hasta su mitad en 2 lóbulos lanceolados agudos; las involucrales sinuadas ó dentadas; periantio cilíndrico, hialino, plegado, pestañoso en su borde. Primavera. R. septentrional y Pirineos.

GÉN. LOPHOZIA DUM. — Difiere del anterior por las hojas insertas oblicuamente, más ó menos ondeadas, con 2-3 ó 5 lóbulos, y el periantio casi cilíndrico, pestañoso en su borde.

1887. *Lophozia incisa* Dum. — Tallo tendido, comprimido, casi sencillo; hojas acumbentes cóncavas, cuadradas, onduladas, hendidas en tres lóbulos y aun casi trífidas; las del periquecio son tri ó cuadrífidas y denticuladas; sin estípulas; periantio terminal aovado, con el borde bucal dislacerado. Norte de España.

1888. *Lophozia quinquedentata* Theb. — Tallo ascendente ramoso; hojas casi cuadradas, tri ó quinquefidas, las periqueciales semejantes á las demás; estípulas bipartidas laciniadas; periantio aovado y terminal. Pirineos.

1889. *Lophozia Lyoni* Tayl. — Tallo ascendente no muy ramoso; hojas casi cuadradas, encorvadas, trífidas; las periqueciales más largas; periantio lateral aovado-plegado, sin estípulas; fruto algo lateral. Habita en los Pirineos.

1890. *Lophozia attenuata*. — Céspedes verde-oscuros, con tallos ascendentes de 15'''-30''', con ramas fasciculadas casi cilíndricas; hojas cóncavas cuadrado-redondeadas, algo plegadas, con lóbulos ovales agudos y algo desiguales; las hojas de las ramitas muy empizarradas, trasovadas, con 3 lóbulos cortos; antigastos nulos ó con 2 lóbulos enteros; hojas involucrales erguidas y con 3-5 lóbulos; periantio oblongo y plegado. Primavera. R. septentrional.

1891. *Lophozia ventricosa* Dum. — Tallo ascendente poco ramoso; hojas acumbentes casi cuadradas, obtusas, algo escotadas, cóncavas, las periqueciales adheridas tri ó cuadrífidas; sin estípulas; periantio ventruído. N. y E.

1892. *Lophozia Mulleri* Dum. — Verde parduzca, con el tallo tendido ascendente, bífido; hojas extendidas ó algo levantadas, cuadrangulares, redondeadas, con dos lóbulos agudos; anfigastras lanceoladas, bí ó trífidas; hojas involucrales mayores, erguidas, con lóbulos laciniados; periantio casi cilíndrico, liso, dentado en su borde. Primavera y Verano. Monserrat.

1893. *Lophozia bicrenata* Dum. — Verde ó anaranjada, con los tallos de 2'''-8''' enteramente tendidos; hojas empizarradas casi verticales, cóncavas, casi orbiculares, cuadradas, hendidas en 2 lóbulos en su cuarto superior; hojas involucrales con 2-3 lóbulos agudos, dentados, y más largos que anchos; periantio blanquecino ó anaranjado, aovado, plegado, laciniado en su borde. N.

1894. *Lophozia Alpestris* Steph. — Céspedes compactos, pardo-rojizos, con ramas erguidas de 10'''-25'''; hojas aproximadas, extendido-erguidas, cóncavas, ovales, casi cuadrangulares, hendida en 2 lóbulos en su quinto superior; hojas involucrales inferiores trilobuladas, enteras ó sinuadas; periantio blanquecino oblongo, ligeramente plegado. Pirineos.

GÉN. BLEPHAROZIA DUM. (Del griego *blepharon*, párpado, y *ozos*, yema.) — Periquecio de 2-3 hojas adheridas, bi ó trilobuladas y