

En 1848 Funk, médico bambergense, herborizó el norte de la Provincia; entre Vertientes y Sierra María, recolectó un *Teucrio* que determinó erróneamente como *T. racemosum* R. Br., que Willkomm le clasificó como nuevo, *T. funkianum* Wk., forma especial del *T. gnaphalodes* Vahl.; también herborizó Cúllar de Baza y el Cerro de Javalcón, de Zujar.

En época más reciente y después de la publicación del Prodrómus Florae Hispanicae de Willkomm y Lange (1861-1880), han visitado la provincia de Almería diversos botánicos españoles y extranjeros:

Porta, botánico austriaco y su colaborador Rigo la recorrieron en 1879-90 (5): En 1890 en Vélez Blanco encontró la *Cirsium paniculatum* Porta; del Castillo de Lorca la *Cytisus fontanesii* Spach v. *apiculatus* Porta et Rigo, y también de Murcia sus *Euphorbiae carthaginensis* y *abortiva*; en Almería, de la base de Sierra Alhamilla, de 100 a 500 m. de altitud, denuncian la *Euzomodendron bourgeanun* Coss., ya recogido por primera vez por Bourgeau y su *Linaria fragrans* Porta et Rigo; en Sierra Tercia de Lorca, tan emparentada con nuestra Provincia, la var. *glabrescens* de la *Iberis Hegelmairi* Wk.; en el Barranco del Caballar, cerca de Almería, con Huter en 1879 y con Rigo en 1890, describen la *Sonchus freynianus* Hut., Porta et Rigo, compuesta espinosa que habrá que asimilar a la propia *Zollikoferia arborescens* de Battandier del N-NO de África.

Reverchon en 1899, tomando como centro Vélez Rubio, recorrió las Sierras de María, Maimón, Tonoza y otras localidades; las plantas recolectadas fueron en parte estudiadas por Hervier y publicadas en trabajo especial (6).

Gandoger visitó la Provincia por primera vez en 1896, recorriendo Huércal Overa, Vera, Sorbas, Sierra Cabrera, Sierra del Cabo de Gata y alrededores de la capital; en sesión del 11 de diciembre del mismo año, de la Soc. Bot. de Francia, dió cuenta de las especies más notables recogidas (7). Al lado de citas interesantes y aciertos sistemáticos, resalta haber encontrado plantas muy críticas, como: *Neurada procumbens* L. rosácea de las sábanas desérticas del África septentrional y del oriente, así como la *Ceratocarpus arenarius* L., planta oriental, tampoco citada en la Europa occidental. Tales especies no han sido encontradas por nosotros, ni por ningún otro botánico que recorriera del SE. de nuestra Península; error o fantasía? de este botánico. En 1902, repitió la visita

(5) Porta D. P.; Vegetabilia in itinere ibérico austro-meridionali lecta; Rovereto, 1892.

(6) Hervier, Joseph; Excursions Botaniques de Eliséé Reverchon dans le Massif de La Sagra (1904 a 1905); Le Mans, 1907; (Extrait Bull. Acad. inter. Géographie Bot.).

Idem; Excursions Botaniques de M. Eliséé Reverchon dans le Massif de La Sagra et á Vélez-Rubio (1899-1903); Le Mans, 1905 (Extrait Bull. Acad. inter. Géographie Bot.).

(7) Gandoger; Flora Europaea, 1890.