

1460 **A. majus** L. *foliis latioribus* Asso. Frecuente en lugares abrigados entre los peñascos de la Tierra-baja, LOSC. PARD. *May. etc.*

foliis angustioribus Asso, *A. majus var. angustifolium* LOSC. PARD. *Séries*. Abunda mucho mas que la precedente en toda la Tierra-baja, Castelserás y todo el bajo-Aragon hasta Cataluña, comunmente sobre las paredes, puentes y edificios ruinosos, en el cabezo de San Cristóbal de Calaceite, Peñarroya, ó en las orillas de las acequias, ó sobre los peñascos, LOSC. PARD. Cerca de Aranda, CALAVIA. *Fl. sin interrupcion desde may. hasta oct.*

A. majus Asso: abunda en Zaragoza, en Hijar, Montalvan, monte de Herrera, etc. Asso *Syn.* En la Almotilla, ECH. *May.*

1461 **A. sempervirens** LAP. Cerca de Beceite, S. PARD. Sobre las rocas calcáreas de los Pirineos centrales; en la parte inferior de Clot de Toro en la Maladeta, LAP. En Castanesa, LEZAT. Rocas de Castanesa, COSTA. *Jun. jul.*

1462 **A. molle** L. Muy rara en las hendeduras de las rocas de granito encima los baños de Panticosa á 5500 pies, WK. *Jun.*

CDIL. ANARRHINUM.

1463 **A. bellidifolium** DESF., *Antirrhinum bellidifolium* L. En las sierras de Toved y de Villarroya, cerca de Santed, Asso *Syn...*

CDL. LINARIA.

1464 **L. spuria** MILL., *Antirrhinum spurium* L. En los campos de toda la Tierra-baja, abunda en los de 