

15 centimètres, et M. Raimondi me dit qu'il en possède une qui est plus grande d'un tiers. Les habitants des Cordillères appellent la plante *Pagra* et assurent que, donnée aux vaches, elle les excite et les rend plus fécondes. L'exsudation abondante qui la recouvre, aussi bien que l'épaisseur de sa cuticule, en mettant obstacle à l'évaporation, en rendent, à ce qu'il paraît, la dessiccation fort difficile.

EXPLICATION DES FIGURES.

F. 1 : sommité d'une plante florifère, de grandeur naturelle ; — f. 2 : feuille radicale : — f. 3 : étamine ; — f. 4 : jeune carpelle.

17. RANUNCULUS RAIMONDII.

R. habitu præcedentis, sed in omnibus fere partibus circiter dimidio minor (undique dense longeque sericeo-pilosus ; foliis radicalibus magnis (limbo unci suppetentis 14 cm. longo et lato), orbiculatis, coriaceis, fastigiatim nervosis, in dimidia parte superiore acute serrato-dentatis, dentibus nonnullis terminalibus multo majoribus inæqualibus ; petiolo (limbum subæquante) inferne glabrato, prope limbum angusto crassoque, inferius latissime membranaceo-dilatato anticeque appendice liguliformi maxima (7 cm. longa, 6 cm. lata) basim limbi superante parteque dilatata petioli continua aucto ; foliis caulinis multo minoribus, plerisque floribus approximatis, ovato-oblongis ovatisve, sessilibus exappendiculatisque, subamplexicaulibus, subintegerrimis ; floribus (in specimine viso 2, altero terminali, altero axillari) breviter pedicellatis, magnis (4-6 cm. latis) ; sepalis (5 cm. longis, 3 cm. latis) ellipticis, virentibus (?), extus sericeo-pilosis ; petalis (4 cm. longis, 3½ cm. latis) rubentibus (?), late obovatis, basi subabrupte attenuatis, supra unguem foveola semilunari cæterumque illi speciei præcedentis subsimili munitis ; staminibus numerosissimis, compacte multiseriatis ; pistillis minimis, innumeris, stylo rostratis ; carpellis....

*Anemone argentea* Raimondi, l. c., n. 48.

*Hab.* PÉROU : parmi les rochers, dans les Cordillères de la province de Patatz!, h. 4000 m. (Raimondi).

*Obs.* — Cette espèce, moins remarquable que la précédente par la grandeur de ses fleurs, est néanmoins tout aussi curieuse, tant à cause du long duvet soyeux qui en revêt presque toutes les parties, que par les grands appendices liguliformes et également soyeux qui s'élèvent verticalement de la partie antérieure des pétioles de ses feuilles radicales. — M. Raimondi assure que les Indiens administrent la plante à leurs enfants pour les faire parler plus promptement ; c'est de là que lui serait venu le nom de *Rima-rima* qui lui est appliqué au Pérou, et qui signifie littéralement : *parler-parler*.

18. RANUNCULUS MACROPETALUS.

R. petiolis foliorum radicalium basi membrana auctis, limbis orbiculatis crenatis glabris pilosisve ; foliis caulinis ovato-lanceolatis, sessilibus ; caule glabro, paucifloro ; calyce adpresso.

*R. macropetalus* DC., *Prodr.*, I, 29. — *R. cochlearifolius* Ruiz et Pav., mscr. ; DC., in Deless.

*Icon. select.*, I, 40, non Horn.

*Hab.* PÉROU : dans les Cordillères (Ruiz et Pav.).

*Obs.* — La plante sur laquelle cette courte description a été faite se trouve dans l'herbier de Lam-

CHLORIS ANDINA, II. (Novembre 1861.)