

alebo nezrastené. Čnelky krátke. Vreteno a stopky dozretých plodov červenopurpurové. Plody bobule alebo plodstvá kôstkovičiek. Semená guľovité alebo obličkovité, mierne sploštené, hladké, čierne.

Rod zahŕňa asi 25 druhov rozšírených v trópoch a subtrópoch Ameriky a Ázie. Niektoré z nich sa pestujú a splnievajú aj v Európe a v súčasnosti sa tu vyskytujú často už ako neofyty a invázne druhy.

Taxonomická poznámka. Rod *Phytolacca* sa niekedy rozdeľuje na dva samostatné rody, ktoré sa odlišujú morfológicky aj chorologicky: neotropický rod *Phytolacca* L. s. str. (plodolisty zrastené, netvorí plodstvo) a paleotropický rod *Sarcoca* Raf. (plodolisty nezrastené, tvoria plodstvo) (cf. Skalický 1985). Aj v zrazenom gyneceu sú však zreteľné jednotlivé plodolisty (aspoň v štádiu kvitnutia). Zrastenosť plodolistov nie je vždy korelovaná s ich počtom. Preto tento samotný znak nie je ešte dostatočným dôvodom na odčlenenie rodu *Sarcoca* od rodu *Phytolacca*.

Základné chromozómové číslo: $x = 9$.

Kľúč na určenie druhov

- 1a Listy široko kopijovité až elipsovité, na vrchole dlho končisté. Stopky listov 15–40 mm dlhé. Gyneceum 10-plodolistové, zrastené. Bobuľa celistvá, po vyschnutí dužiny dookola zaškrcovaná na 10 jednosemenných lalokov **1. *P. americana***
- 1b Listy široko vajcovité až široko elipsovité, na vrchole široko končisté až zaokrúhlené. Stopky listov do 15 mm dlhé. Gyneceum 8-plodolistové, nezrastené. Plodstvo z 8 kôstkovičiek **2. *P. esculenta***

1. *Phytolacca americana* L.

Lícidlo americké

Ic.: Tab. 1, fig. 1, p. 31

Phytolacca americana L. Sp. Pl. ed. 1, p. 441, 1753.

Syn.: *Phytolacca decandra* L. 1762 – *P. vulgaris* Crantz 1766.

Bylina 50–200(–250) cm vysoká. Podzemok mohutný, drevnatý, vznikajúci z viacerých repovito zhrubnutých koreňov. Byle v mohutných trsoch v počte 1–5(–15), duté, vyplnené priehradkovým parenchymatickým stržňom, na báze drevnatá a do 30 mm hrubá, v hornej časti rozkonárená, v dolnej časti bradavičnatá, často červenkastá. Listy na báze byle šupinovité, spočiatku sediace, v polovici výšky rastliny stopkaté; stopka v hornej časti úzko krídlatá, na báze nekrídlatá, do 30 mm dlhá; čepeľ široko kopijovitá až elipsovitá, dlho končistá, s vrcholovým uhlom (50–)55–70(–75)°, často so zúženým vrcholom, (60–)120–160(–185)×(25–)50–70(–100) mm veľká, na líci tmavozele-