

*num nodiflorum* L. 1753 [syn.: *Cryophytum nodiflorum* (L.) L. Bolus 1927] s 15–20 cm dlhými, už od bázy rozkonárenými stonkami a kužeľovitými, čiarkovitými, až 20 mm dlhými listami. Kvety s priemerom 4–5(–10) mm, spočiatku sú biele, neskôr žlté. Z rodu *Dorotheanthus* Schwantes sa u nás zriedkavo pestuje druh *D. bellidiformis* N. E. Br. 1928 (syn.: *Mesembryanthemum criniflorum* L. f.) s 10(–15) cm vysokou stonkou, s vajcovitými, obrátene vajcovitými až lopatkovitými listami a veľkými bielymi kvetmi (s priemerom 30–40 mm) alebo v rôznych odtieňoch ružovej a oranžovej so svetlejším stredom. Jedným z najodolnejších druhov rodu *Delosperma* N. E. Br. pestovaných u nás na skalke je juhoafrický zimovzdorný druh *D. nubigenum* (Schltr.) L. Bolus 1960 (bas.: *Mesembryanthemum nubigenum* Schltr. 1898), tvorí koberce zložené z poliehavých bylí, dužinatých listov a veľkých (s priemerom 20 mm) žltých kvetov, vydrží vonku aj viac rokov.

## LITERATÚRA

Hoskovec, L.: *Mesembryanthemum crystallinum* L – kosmatec. <http://botany.cz/cs/mesembryanthemum-crystallinum/>, 2007

## 2. Tetragonia L.

### Štvorbôčik

*Tetragonia* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 480, 1753.

Rod zahŕňa 60 druhov rozšírených prevažne na južnej pologuli (v Južnej Amerike, Afrike, Austrálii, na Novom Zélande). V Európe rastie 1 adventívny druh.

Základné chromozómové číslo:  $x = 8$ .

### 1. *Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze

Štvorbôčik rozložitý (novozélandský špenát)

*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze Revis. Gen. Pl. 1, p. 264, 1891.

Bas.: *Demidovia tetragonoides* Pall. Enum. Hort. Demidof, p. 150, tab. 1, 1781.

Syn.: *Tetragonia expansa* Murray 1783.

Jednoročná sukulentná, rozkonárená, poliehavá až plazivá, holá, do 100 cm vysoká, chlpatá alebo papilkatá bylina. Listy dužinaté, striedavé, zväčša stopkaté, vajcovito kosoštvorcové až trojuholníkovité, celistvookrajové až mierne vykrajované alebo plytko laločnaté, na vrchole tupé, 10–100×50–50 mm veľké, striebrieto oino-