

1. *Corrigiola litoralis* L.

Drobnokvet pobrežný

Corrigiola litoralis L. Sp. Pl. ed.1, p. 271, 1753.

U nás len

subsp. *litoralis*

Drobnokvet pobrežný pravý

Jednoročná dužinatá, sivastá bylina. Koreň tenký, rozkonárený. Byle poliehavé až vystúpavé, bohato rozkonárené, v kruhovitých trsoch, oblé, 7–20(–30) cm dlhé, holé. Prízemné listy v listovej ružici, až 30 mm dlhé; byl'ové listy striedavé, len v dolnej časti takmer protistočné, zúženou bázou sediace, ± dužinaté, podlhovasto čiarkovité až úzko kopijovité, celistvookrajové, na vrchole tupé, 5–20×1–2 mm veľké. Prílistky suchoblanité, kopijovité, nepravidelne zúbkaté, výrazne kratšie ako listy, belavo lesklé. Súkvetie pazušné alebo terminálne, skrátene do klbkovito stiahnutých vidlíc. Kvety obojpohlavné, 5-početné. Kališné lístky voľné alebo len na báze zrastené, bylinné, vajcovité, tupé, do 1,5 mm dlhé, zelenkaste až purpurovohnedé, vnútorné na okraji blanité. Korunné lupienky široko vajcovité až okrúhlasté, biele alebo ružovkaste, dlhšie ako kališné lístky. Tyčinky kratšie ako korunné lupienky. Semenník 3-plodolistový; blizny veľmi krátke, skrútené. Plod 1-semenná, široko elipsoidná tobolka. Semená tvrdé, 3-boké, 1–1,5 mm dlhé, hnedočierné.

Chromozómy: $2n = 16, 18, 32, 54$ (extra fines).

Biológia, ekológia. Terofyt. Kvitnutie júl–október. Autogamná rastlina. Rastie na kyslých, piesočnatých pôdach, na štrkovitých, riečnych náplavoch v plnárnom stupni.

Celkové rozšírenie. Európsky druh so subatlanticko-submediteránnym rozšírením. Ťažisko rozšírenia má v západnej a juhozápadnej Európe, v strednej Európe sa vyskytuje len sporadicky (povodie riek Labe a Dunaj) alebo chýba. Izolovane sa vyskytuje v severnej Afrike a na Blízkom východe. V južnej Afrike a Amerike je zavlečený.

Rozšírenie na Slovensku. Z územia Slovenska existuje len jeden historický herbárový doklad z Podunajskej nížiny, kam bol s veľkou pravdepodobnosťou prechodne zavlečený loďnou dopravou.

Pannonicum. 6. Komárno (F. Nábělek 1927 SAV).