

U nás len

subsp. *kapela*

Striebrenka hlavičkatá pravá

Trváca trsnatá bylina. Koreň tenký, rozkonárený. Byle poliehavé až plazivé, na konci niekedy vystúpavé, bohato rozkonárené, 5–15 cm dlhé. Listy krížmo proti-stojné, úzko vajcovité až vajcovito kopijovité, brvité, 3–6×1,5–2,5 mm veľké, ce-listvookrajové, zúženou bázou sediace až krátkostopkaté, tupo končisté, na oboch stranách holé, jasno zelené. Prílistky čiarkovito kopijovité, suchoblanité, ± rovnako dlhé ako listy, nápadne bielo lesklé. Súkvetie kľbko, kvety v pazuchách nápadných, striebřistých, blanitých, 3–5 mm dlhých listeňov, ca 2-krát dlhších ako kališné lístky. Kvety obojpohlavné, 5-početné. Kalich trváci. Kališné lístky kopijovité, 1,5–2,5 mm dlhé, živo zelené. Korunné lupienky zakrpatené, alebo úplne chýbajú. Semenník 2-plodolistový, vrchný. Tyčínik 5. Čnelky 2. Tobolky 1-semenné. Semená vajcovité až podlhovasté, 1–1,5 mm dlhé, hnedé.

Chromozómy: $2n = 18, 36$ (extra fines).

Biológia. Hemikryptofyt. Kvitnutie máj–jún.

Celkové rozšírenie. Európsky druh s mediteránnym rozšírením. Ťažisko rozšírenia je na Balkánskom polostrove, odkiaľ zasahuje cez strednú časť Apeninského polostrova do oblasti juhozápadných Álp. Izolované lokality sú udávané z Pyrenejského polostrova.

Rozšírenie na Slovensku. Z územia Slovenska existujú len dva staršie dokumentované údaje z Malých Karpát, ktoré sa vzťahujú na splanené rastliny. Pôvodný výskyt na Slovensku je vzhľadom na celkový areál rozšírenia poddruhu nepravdepodobný.

Carpaticum. 10. Bratislava, Vinohrady (F. Nábělek 1937 SAV). – Plavecké Podhradie (F. Weber 1932 PR; Černý 1932, PRC, 1936 PRC, s. d. SLO, Černý sec. Domin 1936k: 71–72 ut *P. cephalotes*).

8. Scleranthus L.

Sklerant

(Spracovala M. PENIAŠTEKOVÁ)

Scleranthus L. Sp. Pl. ed. 1, p. 406, 1753.

Syn.: *Knave* Adans. Fam. Pl. 2, p. 506, 1763.

Jednoročné, ozimné alebo trváce, na báze drevnatejúce, nízke, trsnaté byliny. Byle