

358). – Bratislava, Rača, Knížkova dolina (Vozárová 1997 BRA). – Mariánka – Pajštún (Wiesbauer 1876a: 153). **12.** Velčice, Srázky, kóta 341 (Eliáš sen. Zprávy Českoslov. Bot. Společn. 7: 155, 1972; Kováčiková 1974 msc. [Rigor. Pr.]. – Kovarce, Kovarecká dubina (Šípošová 1992 not.). **13.** Diviacka Nová Ves, Smolová hora (Jos. Dvořák 1979 BRA). – Ladce (Horvátovszky [recte: Horvátovszky] 1810, sec. Smejkal Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brun. 6/4: 27, 1965). **14a.** Hostie (Manica 1962 ZV). **14c.** Kremnica, pod vrchom Šturec (Textorisová 1892 SLO). – Banská Bystrica (s. coll. 1870 SLO). **14d.** Vígľaš, kopec Rohy, kóta 657 [Májovský et Jurko Biológia (Bratislava) 1956: 136]. **14e.** Bátorce – Pukanec. (S. T. Kupčok Biol. Práce Slov. Akad. Vied 2/9: 14, 1956). – Hronská Breznica (V. Nábělek 1922 SAV). **15.** Mláky, JV od vodnej nádrže Horná studená voda (Suchá 1989 not.). – Rudňany, Galmus (Hajdúk 1959 SAV). **18.** Potok Vrbica Z [Šmídt 1973, 1976 msc. (Záver. Spr.)]. **26b.** Spišský Štiavnik – Primovce (Májovský 1954 SLO). – Ondrej – Vydriň (Suza 1931 BRNU; J. Šmarda Veg. Pom. Spiš. Kotl., p. 65, 1961). – Primovce, blízko vrchu Spanihaj (E. Gy. Nyárady 1912: 67). – Primovce, melafýrové skalky (Suza 1930 BRNU; F. A. Novák et Jos. Dostál 1936; Májovský 1954 SLO; Smejkal 1958 BRNU; E. Michalková et Peniašteková 2007 SAV). – Machalovce (Smejkal 1958 in Smejkal 1965 l. c.). **31.** Topoľa. – Neďaleko križovatky Kolbasov – Príslop – Topoľa (obe Plátek 1969) (všetko in Hadač, Terray et al. Kvetena Bukov. Vrch., p. 42, 1991).

Všeobecný údaj: **9.** Južné Biele Karpaty: Javorina, všade na roliach podjavorinských (Holuby 1871a: 37).

Pochybná lokalita: Necpaly, vrch Borišov, 1 250 m n. m. (Bernátová et al. 2006 in Kliment et al. Prír. Veľkej Fatry, p. 268, 2008). Na základe revízie herbárového dokladu z tejto lokality (Bernátová 2006 SAV ut *S. perennis*) sa zistilo, že ide o zámenu s druhom *S. annuus*.

Ochrana. Kategória ohrozenia **EN** (ohrozený). Zákomom chránený.

## 2. *Scleranthus annuus* L.

### Sklerant ročný

Ic.: Tab. 7, fig. 1, p. 127

*Scleranthus annuus* L. Sp. Pl. ed. 1, p. 406, 1753.

Syn.: *Scleranthus annuus* subsp. *eu-annuus* Graebn. 1919, nom. inval.

Jednoročná, zriedka ozimná rastlina, riedko trsnatá. Byle poliehavé, vystúpavé alebo vzpriamené, riedko rozkonárené, (3–)5–19(–24) cm vysoké, 1-radovo krátko páperisté; stredné články byle (0,7–)0,9–1,7(–3,2) cm dlhé, spravidla dlhšie ako listy. Listy štetinovité, na pošvovitej báze brvité, zriedka holé, stredné byľové listy 7–15(–20) mm dlhé, v pazuchách dolných listov často so zväzočkami listov. Kvety vo vrcholových a pazušných, spravidla bohatých, zriedkavo ± stiahnutých vidliciach zväzočkov. Zväzočky ± sediace, riedke. Kališné segmenty vzpriamené, rovnako dlhé, úzko trojuholníkovité s úzkym, do 0,2 mm širokým, belavým, blanitým lemom, na vrchole končisté, bez osti, 2–3(–4)-krát dlhšie ako tyčinky, v čase zrelosti plodov odstavajúce, rovné. Tyčiniek 10 (fertilných väčšinou len 2–5, zvyšné sterilné, vyvinuté ako sta-