

1905 BP; Thaisz 1908 BP, BRA; Kümmerle 1916 BP; Margittai 1923 BP; Scheffer 1931 BP, SLO; Péntes 1935 BP). – Ladový štít, pod hrebeňom [Paclová 1958 TNP, *Biológia* (Bratislava) 23: 322, 1968]. – Malý Pyšný štít (Paclová *Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.* 19: 264, 1971). – Malá Zmrzlá dolina (Paclová 1966 SLO). – Dolina Zeleného plesa (Margittai 1928 BP). – Zelené pleso (Hazslinszky s. d. BRA; Simonkai 1890 BP; Hulják 1907 BP; Lengyel 1929 BP). – Kopské sedlo (Domin et Krajina s. d. NI; Müller 1947 BRNU). **23c.** Kamenné vráta (Futák 1946 SLO). – Bujačí vrch (V. Nábělek 1936 BRA). – Košiare – Jatky (Sillinger et M. Deyl 1931 NI).

Mylné údaje: **22.** Nízke Tatry (všeobecný údaj). **28.** Babia hora (obe Dostál Květena ČSR, p. 379, 1950, Nová Květena ČSSR 1, p. 158, 1989; Dostál et Červenka Velký Klúč Urč. Vyš. Rastl. 1, p. 174, 1991).

Ochrana. Kategória ohrozenia **VU** (zraniteľný).

LITERATÚRA

pozri pri rode *Cerastium*

19. *Cerastium* L.

Rožec

(Spracovali D. R. LETZ¹, E. MICHALKOVÁ²)

Cerastium L. Sp. Pl. ed. 1, p. 437, 1753.

Jednoročné, krátkodobo trváce až trváce byliny. Korene niťovité až povrazcovité, trváce druhy s plazivým rozkonáreným podzemkom. Byľ jednoduchá alebo rozkonárená, oblá alebo tupohranná, pokrytá jednoduchými žliazkatými alebo nežliazkatými chlpmi, pri trvácich druhoch po odkvitnutí v uzloch zakoreňujúca a tvoriaca nové sterilné, trsovité výhonky; jednoročné druhy s ozimnou prízemnou ružicou listov (bez sterilných výhonkov). Listy krížmo protistojné, sediace alebo krátko stopkaté, celistvookrajové. Listene bylinné alebo s blanitým lemom a vrcholom. Súkvetie vidlica, niekedy redukovaná na jediný kvet. Kvetné stopky niťovité, oblé. Kvety 5-, zriedkavo 4-početné. Kališné lístky na vonkajšej strane chlpaté, na vnútornej strane holé. Korunné lupienky hlboko 2-laločné, na vrchole so zárezom maximálne do 1/2 dĺžky lupienka, biele, holé alebo na báze na okrajoch brvité. Tyčínik 5–10. Semenník guľovitý, holý. Čneliek (stylódií) 5, episepálnych, holých. Tobolky s trvácim kalichom a hladkým blanitým oplodím, podlhovasto valcovité, rovné alebo

¹ Druhy *C. arvense*, *C. brachypetalum*, *C. glomeratum*, *C. glutinosum*, *C. pumilum*, *C. semidecandrum*, *C. subtetrandrum*, *C. tatrae*, *C. tenoreanum*.

² Druhy *C. alpinum*, *C. eriophorum*, *C. fontanum*, *C. holosteoides*, *C. latifolium*, *C. lucorum*, *C. sylvaticum*, *C. tomentosum*, *C. uniflorum*.