

3. *Cerastium pumilum* Curtis

Rožec nízky

Ic.: Tab. 17, fig. 1, p. 311

Cerastium pumilum Curtis Fl. Lond. 2 (6), no. 69, tab. 92, 1795.

Syn. *Cerastium obscurum* Chaub. 1821 – *C. pumilum* subsp. *obscurum* (Chaub.) Schinz et The11. 1907 – *C. glutinosum* auct. non Fr. p. p.

Jednoročná, 2–20(–25) cm vysoká bylina. Koreň niťovitý, rozkonárený. Byľ jed-
na alebo od bázy rozkonárená do trsu viacerých bylí, vzpriamená alebo vystúpa-
vá, tmavozelená, často najmä na báze červenkastá, husto chlpatá, v dolnej časti (na
najnižšom internódiu jarnej kvitnúcej byle) s 0,2–0,6 mm dlhými žliazkatými i ne-
žliazkatými (niekedy len s nežliazkatými alebo ojedinelými žliazkatými) chlpmi,
v horných dvoch tretinách so žliazkatými a roztrúsenými nežliazkatými chlpmi. Lis-
ty prízemnej ozimnej ružice v dolnej polovici zúžené do stopky, na rube holé, na
líci a na okrajoch riedko nežliazkaté chlpaté, v čase kvitnutia postupne zasychajú-
ce; byľové listy elipsovité až kopijovité, tupé až ostro končisté, 5–15×2–7 mm veľ-
ké, (1,5–)2–4-krát dlhšie ako široké, tmavozelené, na vrchole často s červenou špič-
kou, na obidvoch stranách na ploche s nežliazkatými i žliazkatými chlpmi (žliazkaté
chlpy aspoň na najvyššom páre byľových listov, aspoň na rube; veľmi ojedinele
chýbajú). Listene na líci holé až lesklé, niekedy (v prípade primárnych listeňov) so
žliazkatými a/alebo nežliazkatými chlpmi; na rube husto žliazkaté chlpaté; primár-
ne (najspodnejšie) listene podlhovasto elipsovité až kopijovité alebo vajcovité, kon-
čisté alebo zriedkavejšie špičkaté alebo tupé, 3–6(–8)×1,2–5 mm veľké, s nenápad-
ným blanitým vrcholom zaberajúcim maximálne 20 % dĺžky listeňa alebo celkom
bez blanitého lemu či špičky; sekundárne (nasledujúce vyššie) listene kopijovité,
vajcovité až elipsovité, končisté, 2,5–5×1,5–3 mm veľké, s blanitým vrcholom za-
berajúcim maximálne 20 % dĺžky listeňa. Súkvetie zaberajúce (10–)20–50 % výšky
rastliny, 3–20-kveté, konáre husto pokryté 0,15–0,3 mm dlhými žliazkatými chl-
pmi, zvyčajne tiež s ojedinelými nežliazkatými chlpmi. Kvetné stopky v čase kvitnu-
tia vzpriamené, v plodnom stave v hornej časti jemne nadol sklonené, pri niektorých
kvetoch na báze ohnuté (max. do 90°), husto odstavajúco chlpaté žliazkaté; stopka
primárneho kvetu (aj plodu) 6–15 mm dlhá, 1,5–2,5-krát dlhšia ako kalich. Kališ-
né lístky v hornej polovici s blanitým lemom, končisté, v primárnych kvetoch (4,5–)
5–6(–6,7)×0,8–1,6 mm veľké, na vonkajšej strane husto pokryté maximálne 0,35–
0,55(–0,65) dlhými žliazkatými chlpmi, pod vrcholom tiež s nežliazkatými chlpmi,
chlpy nepresahujú vrchol kalicha. Korunné lupienky obrátene vajcovité, na vrcho-
le hlboko 2-laločné, so zárezom do 25–40 % ich dĺžky, 4,1–6,3×1,9–3,5 mm veľké,
dlhšie alebo také dlhé ako kalich, aj na báze holé. Tyčínok (5–)6(–10), nitky 2–3
mm dlhé, holé, peľnice 0,4–0,6 mm. Čneliek 5, (1–)1,1–1,4(–1,6) mm dlhých. To-