

5. *Cerastium glomeratum* Thuill.

Rožec kľbkatý

Ic.: Tab. 18, fig. 3, p. 325

Cerastium glomeratum Thuill. Fl. Paris, ed. 2, p. 226, 1799.

Syn.: *Cerastium viscosum* auct. non L.

Jednoročná, (3–)8–35(–40) cm vysoká bylina. Koreň nit'ovitý, rozkonárený. Byľ jedna alebo na báze rozkonárená do trsu viacerých byľí, vzpriamená alebo vystúpavá, aj s listami zelená až žltozelená, niekedy červenkastá, husto odstávajúco chlpatá, v dolnej časti s 0,8–1,3 mm dlhými nežľiazkatými chlpmi, v horných dvoch tretinách so žľiazkatými chlpmi, ukončenými veľmi drobnou svetlou žľiazkou. Listy prízemnej ružice obrátene vajcovité, elipsovité až lopatkovité, v dolnej tretine až polovici často zúžené do stopky, na vrchole zaokrúhlené, tupé, s nasadenou špičkou, na líci husto a dlho nežľiazkato chlpaté, na rube s chlpmi redšími a kratšími; byľové listy elipsovité až široko elipsovité, tupé alebo špičkaté, (3–)8–20(–28)×2–16 mm veľké, 1,3–2,2-krát dlhšie ako široké, z oboch strán nežľiazkato chlpaté, s chlpmi na okraji do 2 mm dlhými; najvyšší pár listov nežľiazkato chlpatý, prípadne aj s roztrúsenými žľiazkatými chlpmi. Listene celé byľinné, listom podobné, bez blanitého vrcholu, o niečo menšie než najvyššie byľové listy, z oboch strán husto chlpaté, so žľiazkatými aj nežľiazkatými chlpmi; sekundárne alebo vyššie horné listene na vnútornej strane holé. Kvetné stopky vzpriamené alebo jemne ohnuté, v čase zrelosti plodov 1,5–5(–6) mm dlhé, (0,3–)0,5–1-krát také dlhé ako kalich, husto a krátko odstávajúco chlpaté, s prevažujúcimi nežľiazkatými chlpmi. Kališné lístky úzko kopijovité, s blanitým lemom, na báze s vyčnievajúcou strednou žilou, na vrchole ostro končisté a často červenkasté, 4–5,5(–6)×1,1–1,3 mm veľké, na vonkajšej strane husto pokryté do 0,6 mm dlhými žľiazkatými chlpmi, pod vrcholom a niekedy aj na báze tiež s dlhšími nežľiazkatými chlpmi; nežľiazkaté chlpy do 1,3 mm dlhé, výrazne presahujú vrchol kalicha. Korunné lupienky široko kopijovité, na vrchole hlboko 2-laločné, so zárezom do 10–25 % ich dĺžky, 3,5–5,5×0,9–1,7 mm veľké, o niečo dlhšie alebo kratšie ako kalich; niekedy však redukované (až chýbajúce), menšie, s malým alebo žiadnym zárezom; na okraji bázy s malým počtom veľmi krátkych bŕv. Tyčieniek 5–10, vnútorný kruh často degenerovaný alebo chýbajúci; nitky 1,2–2 mm dlhé, holé; peľnice 0,35–0,4×0,25–0,3 mm veľké, v apetalných kvetoch menšie. Čneliek 5, 0,6–0,8 mm dlhých, v apetalných kvetoch kratších. Tobolky rovné alebo v hornej polovici nahor zakrivené, úzko valcovité, 6–9×1,3–2 mm veľké, pukajúce na vrchole 10 zubmi. Semená diskovité, mierne zboku sploštené, s priemerom 0,5–0,6 mm, svetlo hrdzavohnedé, na povrchu s o niečo tmavšími podlhovastými tupými až jemne končistými hrbolčekmi.