

1923 PRC). **23b.** Štrbské Pleso (Jos. Dostál 1936 PRC). – Malá Studená dolina (Kyselová et Šoltéssová 1978 TNP). – Velická dolina, Kvetnica (Spudilová 1956 PR). **23c.** Dolina Siedmich prameňov (Holubyho dol) (Domin 1925 PRC). – Kobyly vrchy, údolie J od kóty 1244 (Müller 1946 BRNU). – Vyšná Kobyliarka, Tokárska dolina (Domin 1935 PRC). – pod Podkošiarimi (Domin 1935 PRC). – Tatranská Javorina, pod Havranom (Májovský 1968 SLO). – Ždiar (Domin 1933 PRC). – Dolina Hlbokého potoka (Hadač 1956 PR). **23c./29.** Tatranská Kotlina (Domin 1935 PRC; 1937 NI, PRC). **24.** Červený Kláštor (Domin 1932 PRC). – Lesnícký les (Májovský 1953 SLO). – Haligovce, Haligovské skaly (Domin 1932 PRC). **28.** Radoľa, Koscielisko (Letz 2010 SAV). – Tvrdošín, železničná stanica. – Trstená, železničná stanica (obe Letz 2011 SAV). – Klin, rašelinisko (Šiposová 2009 SAV). – Zubrec (Májovský 1954 SLO). – Habovka (Bernátová 1978 BBZ). **29.** Mníšek nad Popradom, Vysoký grúň (Chrtek et Deylová 1985 PR). **30a.** Prešov (Hazslinszky s. d. BP). **30b.** Čergov (Májovský 1960 SLO). **30c.** Komárany SV (Letz 2009 SAV). – Bardejov, časť Kúpele, Stavenec (Záborský 1972 SLO). – Bardejov, Kamenná hora (Záborský 1971 SLO). – Rokytovec SV, údolie potoka Rokytovec (Letz 2011 SAV). **30c./20.** Dlhé nad Cirochou (Májovský 1968 SLO). **31.** Príslp, dolina Dara (Soják 1960 PR). – Stakčín JV, kopec medzi dolinami Ofchovec a Trnovec (Letz 2011 SAV).

6. *Cerastium brachypetalum* Desp. ex Pers.

Rožec krátkolupienkový

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. Syn. Pl. 1, p. 520, 1805.

Jednoročná, 7–30(–40) cm vysoká bylina. Koreň niťovitý, rozkonárený. Byľ jedná alebo na báze rozkonárená do riedkeho trsu viacerých byľí, vzpriamená alebo vystúpavá, rovnovážne alebo šikmo nahor odstávajúco husto chlpatá až vlasatá, s chlpmi do 1,7(–2,5) mm dlhými a tiež s početnými kratšími chlpmi; na báze byle chlpy nežliazkaté, na horných internódiách chlpy žliazkaté, vzácne nežliazkaté alebo len nežliazkaté; žliazky na vrchole chlpor podlhovasto oválne; byľ aj s listami sivozelená až žltozelená, niekedy tmavšia a purpurovo červenkastá. Listy prízemnej ružice obrátene vajcovité až lopatkovité, v dolnej tretine často zúžené do stopky, na vrchole zaokrúhlené, s nasadenou špičkou, na líci riedko až husto nežliazkatato chlpaté, na rube holé alebo s roztrúsenými chlpmi; byľové listy elipsovité, vajcovité až široko kopijovité, tupé alebo končisté, špičkaté, 5–15(–20)×2–7 mm veľké, 1,5–3-krát dlhšie ako široké, na špičke často s tmavočervenou škvrnou, z oboch strán husto pokryté dlhými sivými chlpmi, výrazne presahujúcimi okraje listov, na báze chlpy odstávajúce, až 2,5 mm dlhé. Listene bylinné, podobné listom (bez blanitého vrcholu), o niečo menšie než najvyššie byľové listy, z oboch strán husto chlpaté. Súkvetie 3–50(–70)-kveté, riedke alebo husté, konáre husto pokryté žliazkatými a/alebo nežliazkatými chlpmi. Kvetné stopky vzpriamené alebo jemne do boku odstávajúce, v čase zrelosti plodov iba pod kalichom o ca 90° ohnuté, husto rovnovážne až šikmo odstávajúco chlpaté, so žliazkatými a/alebo nežliazkatými chlpmi; stopka primárneho kvetu v čase zrelosti plodov 8–17(–23) mm dlhá, 2–4,5-krát dlhšia ako ka-