

2. *N. rubiformis*, subsessilis, orbicularis, gyrosa, lutea. Fr. II. cc.

Tr. enecephaloides & alutacea, Schum. Sall. 2, p. 438.
Enc. aurantiacum? Link. l. c. p. 35.

Præcedente minor, magis depressa, nucleo minus discreto, superficie gyroso-tuberculosa nec plicata e. s. p. Media inter Ditiolam radicatam & Dacr. abietinum. Ad ligna & ramos, hieme, vere. (v. v.)

3. *N. nucleata*, sessilis, applamata, subgyrosa, flavo-fusca.

Tr. nucleata. Schwein. Syn. l. c. n. 1142.

Primo orbicularis, lævis; mox subpezizoidea, 1-4 lin. lata, *Dacrymyces stillatum* b. interdum referens, interdum pulvinata, plicatorugosa. Nucleus constanter præsens & valde prominens, primo punctiformis, dein Sclerotiformis albidus. "Componitur ex aliqua membrana, non satis conspicua & intus materia sicciore, quæ farinæ speciem magis habet, quam gelatinæ. Passim in ramulis Carolina. (v. s. a. Cel. Schwagr. missam.)

IV. DACRYMYCES. Nees.

Tremellæ spec. Auct. Dacrymyces. Nees Syst. p. 89.

CHAR. Receptaculum carnosogelatinosum, homogœneum, undique fructificans, glabrum, demum subdeliquescens. Papillæ nullæ. Contextus floccosus, floccis assurgentibus, quibus sporidia interspersa. — Forma rotundata l. disciformis, vix marginata, subsessilis, superficie varia.

HISTOR. Typus generis est Tr. deliquescens Bull. Fungi minores, gregarii, epiphyti, (lignatiles sæpius radicati) sat persistentes, matricem destruentes, interna constructione ad Mucedines prope