

parce pilosa, supra glabra vel sub antheris parcissime glanduloso-pilosa. Antherae oblongae, sensim acuminatae, circa suturam lanuginosae, siccae albae. Germen ellipsoideum; stylus glanduloso-pilosus; stigma bilobum, luteum, exsertum. Semen testa minute distanter porosa.

Formas sequentes profert:

1. (**Orobanche**) **albo-lutea**.

Corolla alba, (stamina et pistillum luteum). Spica plurimum densiflora vel in basi modo laxiflora; calycis segmenta ovata.

Synonymia:

Orobanche macrolepis Turczaninow, Cat. Baikal. nr. 878 et in Ledebour, Flora ross. III 1, p. 323, nomen solum, non Cosson; — Turczaninow, in Bull. Soc. imp. Moscou XXIV, p. 356 (1851). Vidi orig. in herb. Petrop.; — Maximowicz, Prim. flor. Amur. p. 211.

Orobanche spec. Bretschneider, Botan. sinic. p. 114 (1882).

2. **typica** = **Orobanche pycnostachya** Hance.

Corolla lutea; cetera ut in priore. (Fig. nostr. 32.)

Synonymia:

Orobanche pycnostachya Hance, in Journ. of the Linn. Soc. XIII, p. 84 (1873).

Cum forma 1 imprimis in regno Chinensi.

3. (**Orobanche**) **amurensis**.

Corolla coerulescens vel azurea; calycis partes angustiores interdum integrae; spica saepe tota laxa.

Synonymia:

Orobanche ammophila Maximowicz, Prim. flor. Amur. p. 211, ex max. parte, non C. A. Meyer.

Territ. Amurense et Mandschuria.

Plantae nutrices.

Crescit ad radices Artemisiarum. (? *Artemisia campestris* L. et *A. desertorum* Spr.)

Area geographica.

O. pycnostachya Asiae orientalis partem mediam ab fl. Schilka Transbaikaliae usque ad mare japonicum et insulam Kiu-siu et inde per Mandshuriam ad montes Wu Tai-shan (38° alt. sept.) Chinae borealis incolat.

Vidi ex:

Transbaikalia: ad fl. Schilka (f. 1 leg. Turczaninow, in herb. Petrop.); Mongolia: in monte Muniula (leg. Przewalski); Mandshuria et territ. fl. Amur: ad Bureiae ostium, prope Possjet, Poriph, Poddale, Dsikiri prope Blagowestschensk (f. 3 leg. Maximowicz) et in prov. Schönking (leg. J. Ross); Japonia: in insula Kiu-siu prope Nagasaki (f. 3 leg. Maximowicz); China borealis (leg. Fischer), circa Peking (herb. Hance nr. 17048) prope Tang-shan, Si-yusze, Yiu-shan, Mt. Conolly (f. 1 et 2 leg. Bretschneider, in herb. Petrop.), Siao Wu Tai-shan (leg. Moellendorf).

Floret Majo—Julio.

33. **Orobanche cernua** Loefling.

Tota subfurfuraceo breviter glandulosa, saepe glabrescens; calycis partes in apice rarius profundius bidentatae vel integrae; corolla 10—20 mm longa, acriter pronus curvata cum fauce saepe