

et cryptogames connus en Allemagne : le premier de ceux qui y sont indigènes, le second de ceux qui y sont cultivés. Dans ce dernier, les Fougères ont été traitées par Schnizlein. [E. F.]

BERGERA (KÖEN., in *L. Mantiss.*, 563). Syn. de *Murraia* L.

BERGERA (SCHAFFN., in *Fée 9^e Mém.*, 30). Syn. de *Didymoglossum*. [E. F.]

BERGÈRE. Nom vulg. de la Grande-Pervenche.

BERGEREÆ (REICHB., *Handb.*, 314). Sect. des Limoniées, contenant les g. *Bergera*, *Sclerostylis*, *Glycosmis* et *Limonia*. [L.]

BERGERET (J.). Né à Morlaas, mort en 1814, a publié la *Flore des Basses-Pyrénées* (Pau, an XI, 2 vol. in-8°), rédigé suivant la méthode linnéenne, interrompu à la polyandrie. [E. F.]

BERGERET (Jean-Pierre). Né le 25 nov. 1751 à Lasseube, dans la généralité d'Auch. On connaît de lui un mémoire sur les Amanites, publié dans le *Journal de médecine*, en octobre 1783, et surtout sa *Phytonomatotechnie universelle* (Paris, Didot jeune, 1783-85, 3 vol. in-fol.), où il désignait les plantes sous des noms bizarres, tels, par exemple, que *Jytypjiajeqew*, nom dont chaque lettre, l'une après l'autre, conduit, par le système de Bergeret, à la connaissance de l'espèce à laquelle appartient la plante qui le porte. La dernière livraison, qui devait contenir la clef du système, n'a pas paru. Les exemplaires les plus complets de la *Phytonomatotechnie* contiennent 328 planches. [E. F.]

BERGERETIA (DESUX, in *Journ. Bot.*, III, 161). Syn. de *Clypeola lasiocarpa* PERS.

BERGERIA (STERNB., *Vers.*, II, 183). G. fossile de Lycopodiacees, attribué par Unger (*Synops.*, 133; *Chlor. prot.*, LVIII) aux Lépidodendrées. [L.]

BERGGREN. Aumônier de la légation suédoise à Constantinople, a fait, en 1819 et 1820, des excursions dans la Syrie et dans l'Arabie. Ses pl. ont été déterminées par Wahlenberg. [E. F.]

BERGHAUSIA (ENDL., *Gen.*, Suppl., III, 57). Syn. de *Miquelia* ARN. et NEES.

BERGHESIA (NEES, in *Linnaea*, XX, 701). Plante mexicaine, rapportée aux Cinchonées, mais dont la place reste incertaine.

BERGHIA. Voy. BERGKIAS.

BERGIA (FURNROHR, in *Flora* [1829], II, *Erg. Bl.*, 59). Syn. de *Entosthodon* SCHWÆGR.

BERGIA (L., *Mant.*, n. 1309). G. d'Élatinées, voisin des *Elatine*, dont il se distingue par le nombre des parties de chaque verticille de la fleur qui est construite ordinairement sur le type cinq et plus rarement trois ou quatre. Les sépales sont aigus, imbriqués, presque hyalins sur les bords; la capsule est à peu près crustacée. Les *Bergia* sont des herbes ou des sous-arbrisseaux des régions tropicales ou subtropicales; on en connaît une quinzaine. (Voy. B. H., *Gen.*, I, 163. — H. BN, in *Payer Lec. fam. nat.*, 389.) [L.]

BERGIERA (NECK., *Elem.*, n. 983). Syn. de *Bergia* L.

BERGINIA (HARV., ex B. H., *Gen.*, II, 1096). G. d'Acanthacées, voisin des *Eranthemum* et qui a beaucoup des caract. des *Stenandrium*, avec le port des *Anisacanthus*. Sa corolle a un tube court, dilaté supérieurement. Ses deux lobes postérieurs sont plus courts que les autres et dressés. C'est un petit arbrisseau californien (*B. virgata*), à feuilles étroites, à épis terminaux, interrompus, feuillés à la base. [H. BN.]

BERGIOTYPUS (SEUB., in *Walp. Rep.*, I, 285). Sect. du *Bergia* L.

BERGIUS. Nom de deux frères suédois, botanistes du XVIII^e siècle, qui possédaient aux portes de Stockholm un grand jardin où ils élevaient des plantes rares, jardin qu'ils léguèrent à l'Académie de Stockholm, avec un capital considérable, pour qu'il y fût établi une chaire de botanique appliquée à la culture.

BERGIUS (Bengt ou Benoît) (1723-1784). Commissaire à la banque de Stockholm et membre de l'Académie, a publié entre autres les notices suivantes : *Sur le Lycoperdon Bovista* (Hendling, 1762); *Sur le Raphanus sativus gongylodes* (Hendling, 1767). [E. F.]

BERGIUS (Pierre-Jonas). Le plus connu des deux frères, médecin, professeur d'histoire naturelle et membre de l'Académie à Stockholm, né à Erikstad en 1730, mort à Stockholm en 1790, ayant reçu de Grubb, directeur de la Compagnie des Indes de Suède, un herbier considérable du Cap (recueilli par Auge,

jardinier-collecteur, entretenu dans cette colonie par les Hollandais), donna la description de ces plantes dans un ouvrage intitulé : *Descr. plantarum ex capite Bonæ Spei* (Stockholm, 1767, in-8°). Il est aussi l'auteur de : *Materia medica e regno veg. sistens simplicia officinalia pariter atque culinaria* (Stockholm, 1778, in-8°, 1781, in-8°), ainsi que de plusieurs mémoires insérés parmi ceux de l'Académie des sciences de Stockholm et de la Société royale de Londres. Son herbier est à Stockholm. On connaît encore un botaniste de même nom, mort au Cap en 1818, à l'âge de vingt-huit ans, K. H. BERGIUS, qui fit dans l'Afrique australe des collections conservées aujourd'hui au musée de Berlin. [E. F.]

BERGKIAS (SONNER., *Voy.*, 48, t. 17, 18; in *Journ. phys.*, III, 299, t. 3). Syn. de *Gardenia* ELLIS.

BERGSMIA (Cornelis Adrian). Professeur de botanique à l'université d'Utrecht en 1859. On a de lui : *De Thea* (Trajecti ad Rhenum, 1824, in-8°, 52 p.), suivi d'un Catalogue chronologique des auteurs qui ont écrit sur le Thé, et un Mémoire sur la maladie des Pommes de terre dans les Pays-Bas en 1845. [E. F.]

BERGSMIA (BL., *Rumphia*, IV, 23, t. 178 C, fig. 2). G. de Bixacées, sér. des Pangées, dont les fleurs sont analogues à celles des *Pangium*, mais plus petites. Leur androcée est formé de 4-6 étamines fertiles (réduites à des languettes stériles dans les fl. femelles), à filets rapprochés inférieurement en tube et à anthères rayonnantes, d'abord introrses, puis tournant en haut leur fente de déhiscence. Le fruit n'est pas connu. Ce sont des arbres à feuilles alternes, munies de stipules, et à fleurs axillaires, disposées en grappes simples. On en décrit une esp. (*B. odorata* R. Br.), de Java. (Voy. H. BN, *Hist. des pl.*, IV, 318.) [T.]

BERGUE. N. vulg. de l'Aune commun (*Alnus glutinosa* W.).

BERHARDIA (MUELL.). Syn. de *Berardia* VILL.

BERIESA (STEUD., *Nomencl.*, I, 199). Syn. de *Anredera* J.

BERIGOULA, BÉRIGOULE. Ce terme, assez répandu dans le Midi et surtout dans le Sud-Est, paraît s'appliquer à des plantes fort diverses et toutes comestibles : tels sont une var. du *Cynara Scolymus*, plusieurs Pleurotes et surtout l'*Agaricus Eryngii*.

BERINGER (Joannes Bartholomæus Adam). Médecin et naturaliste allemand, professeur à l'université de Würtzbourg, qui a vécu dans la première moitié du XVIII^e siècle, a publié, entre autres ouvrages : *Plantarum quarundam exoticarum perennium in horto medico Herbipolensi, 1721 erecto, Catalogus* (Wurtzbourg, 1722, in-fol.). Ce n'est qu'un catalogue purement nominal. [E. F.]

BÉRINGÈNE. Nom vulg. du *Solanum esculentum* DUN.

BERINGERIA (NECK., *Elem.*, I, 312). Voy. BALLOTE.

BERINI. Abbé de Monfalcone, qui vivait en 1810, a donné des commentaires estimés à une édition de Pline. [E. F.]

BERINIA (BRIGNOL., *Pl. Florojul.*, 50). Syn. de *Crepis*.

BERISIA (SPACH, *Suit. à Buffon*, VI, 167). Sect. du g. *Ribes*.

BERKELEYA (GREV., *Scotch Crypt. Flora*, t. 294). G. d'Algues-Diatomées, de la fam. des Naviculacées (RABENH. — KUETZ.), caract. par : frustules naviculaires, étroits, linéaires-lancéolés, à extrémités un peu obtuses, marqués au centre d'un nodule de petite taille. Un nombre assez considérable d'individus sont réunis, par une substance gélatineuse, molle, en une masse commune, irrégulièrement arrondie, de laquelle partent des prolongements simples ou ramifiés. Les frustules sont disposés au milieu de cette substance en séries parallèles, assez régulières. On ne connaît qu'une ou deux esp., de la mer du Nord et l'Adriatique. (Voy. RABENH., *Fl. europ., Alg.*, I, 264, 21, f. 68.) [L.]

BERKENHOUT (John). Né à Leeds en 1730, mort à Besselsleigh le 3 avril 1791, a publié : *Clavis anglica linguæ botanice* (Londres, 1764, in-8°), sorte de dictionnaire anglais de botanique; et *Outl. Nat. History of the Great Britain and Ireland* (Londres, 1770, et 1789, in-8°). [E. F.]

BERKHEY (Jan Le Francq van). Né à Leyde en 1729, fut appelé à professer à l'université de Leyde en 1773. Il mourut à Haag en 1812. On a de lui : *Expositio characteristicæ structuræ florum qui dicuntur Compositi* (Lugdun. Batav., 1760, in-4°). [E. F.]

BERKHEYA (EHR., *Beitr.*, III, 137). G. de Composées, tribu des Arctotidées, sous-tribu de Gortériées, dont les capitules,