

multo breviores v. fere isodiametricæ. Nervorum lateralium fasciculi utrinque fibris mechanicis armati, laminâ fibrosâ cum epidermide superâ conjuncti, subtus immersi v. cellulis fibroso-collenchymatosis cum epidermide infera connexi. Nervi medii fasciculus leviter arcuatus, subtus laminâ fibrosâ, suprâ ad margines mole fibrosâ sustentus; glandula et collenchymate superatus. Petioli fasciculus conformis, fibris mechanicis destitutus. Glandulæ canaliformes inter fasciculos majusculæ, subtus et ad lateres conceptaculis vasiformibus spiralibus cinctæ, immersæ. Crystalla echinata in petioli parenchymate, in mesophyllo inter cellulas paliformes superas rariora.

Racemi axillares numerosissimi, foliis breviores, 2-4 cm. longi, 7-9-flori, rachi pedicellisque 3-8 mm. longis gracilibus patentibus nunc sinuosis. Flores parvi, circit. 5 mm. lati. Sepala 4, orbiculata, membranacea, flabellato-venosa, exteriora interioribus similia. Petala 0 v. (1-)4. Stamina numerosa, 40-50. Stylus erectus apice in stigma pelatum dilatatus. Fructus ovatus, 14 mm. longus, 10-12 mm. latus, apice leviter attenuatus, mesocarpio carnosio.

J'ai déterminé cette plante qui est représentée par de nombreux exemplaires dans les herbiers, d'après les descriptions, l'échantillon type de Wallich n'ayant pas été à ma disposition. Elle est facile à reconnaître par la forme de ses feuilles, le bord de couleur claire qui tranche nettement sur la teinte brun foncé de la face supérieure des feuilles, le nombre considérable de fleurs très petites et qui donnent aux rameaux l'aspect de grappes composées et feuillées.

M. Pierre ne croit pas à l'identité du *C. plicipes* avec le *C. pulcherrimum*. Comme je n'ai indiqué cette fusion que sur la foi de Kurz, je reproduis ci-dessous la description de Miquel :

Præter gemmas puberulas glabrum; ramuli ultimi 4-goni; folia sæpius haud exacte opposita, brevi-petiolata (petioli antice canali omnino clauso, transverse plicati) e basi acuta elliptica v. lanceolato-elliptica, obtuso-apiculata v. obtusiuscula, firmiter pergamacea, lucida, margine levi plano cincta, costa supra convexa prominula (in sicco tenuiter unisulca) subtus vero depresso-applanata, 2 $\frac{1}{3}$ — 1 $\frac{1}{2}$ poll. longa; flores... A *C. bancano* (id. e *pulcherrimo*) cui sine dubio proxime accedit, foliorum caractere satis distinctum.

23. *C. Burmanni* Wight, *Ill.*, I, 129; *lc.*, t. 107, 188; Planch. et Triana, *Mém. Guttif.*, 233; Thwait., *Enum.*, 52; Beddome, *Flor. Sylvat. Gen.* XXII (non Seemann, *Fl. Viti.*); Vesque, *Epharm.*, II,