

geminis, horizontalibus: rhachi articulata; floribus parte supremâ internodii rhacheos singuli fasciculatis. *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall. I. p. 291. n. 11.* quo teste etiam *P. dimidiatum Burm. ind. p. 25. t. 8. f. 2.* (TRACHYS *muricata Trin. Fund. agrost. p. 172.*)

„Culmi ramosi, apice suberecti, 10-20 poll. Folia brevia, latiuscula pilis mollibus, vaginâ magnâ pubescente, maximam culmi partem obvolvete. Spicae terminales, subinde cornuum ad instar ascendentes. Rhachis articulis 4-8, oblongis, costâ undulatâ divisivis, utrinque membranaceis. Flores in fasciculis sessilibus 4-8, alternis. Cal. exterior parvus, lanceolatus, secundus magnus, laxè corollam ambiens, acutus, striatus; interior fere aequè parvus ac exterior, a basi in acumen attenuatus tenuè, trinervis, marginibus ciliatis, paleaceis. Cor. generis“ (PANICI!) „valvulâ inferiore calycis fere longiore, valvulâ membranaceâ tertiâ neutrâ.“ *Roxb. l. c. In sabulosis aridis ad mare.*

Pag. 257. n. 14. CENCHRUS *frutescens.* Addatur:

Obs. CENCHRUM *frutescentem* Alpin. nil nisi stolones saepe triorgyalus DONACIS *arundinacei* esse Sieber bot. Zeit. 1822. S. 14.

Pag. 258. n. 19. CENCHRUS *pilosus.* Huic subjungatur:

n. 19a. CENCHRUS *hirsutus* Spreng.; foliis plicatis, hirsutis; spicâ simplicibus; involucris linearibus, 10-fidis, hispidis; spiculis subquinis, rufescentibus, involucrium aequantibus; valvulis acuminatis. *Spreng. N. Entd. III. p. 15.*

C. *pilosus* Humb. et Bonpl. aemulus; sed differt foliis solummodo pilosis, involucrio setaceo flosculos multo excedente, setis nigris, valvulis latioribus, subtruncatis. *Spreng. In Hispaniola.*

Pag. 258. n. 21. CENCHRUS addatur:

n. 22. CENCHRUS *biflorus* Roxb.; spicis simplicibus, cylindricis; involucris bifloris, segmentis subulatis, hamatis, intus pilosis. *Roxb. Fl. ind. ed. Car. et Wall. I. p. 238.*

Culmus rectus, $1\frac{1}{2}$ -2 ped.; glaber. Folia longa, gracilia, scabriuscula, ore vaginarum subpilosa. Spicae terminales, solitariae, cylindricae, 3-4 poll. Rhachis flexuosa, triangularis. Flores numerosi, solitarii, alterni. Involucra rarius uniflora, multifida, laciniis flore longioribus, subulatis, dorso sulcatis. Flos uterque hermaphroditus. Cal. 3-valvis, uniflorus, exterior minor; omnes tenues, glabri, nervosi. Cor. bivalvis, valvulis duris, acutis nec subulatis, subaequalibus, calyce vix longioribus. *Roxb. l. c. In interioribus elatioribus siccis littoris Coromandel. Quid CENCHRUS gracilis P. de Beauv.?*

n. 202. PENNISETUM.

Pag. 258. n. 1. PENNISETUM *polystachyum.* Addatur:

Obs. Sub hac specie tres forte latitare videntur species:

1. PENNISETUM *polystachyum*, quod: PANIGUM *polystachyum*; spicis tetraetibus; involucellis unifloris, fasciculato-setosis; culmis erectis, se-